

var. *campana* Em. Portici (*Emery*) ♀♂.

var. *spinosa* Em. Sardegna, S. Vito, Tacco Sant'Antonio (*Gestro*); ♀.

primo segmento del picciuolo concavo d'avanti in dietro sulla superficie anteriore; capo di grandezza regolare. Lungh. 4,5 millim.

Sicilia, Puglia.



A. testaceo-pilosa.
var. *Campana*. ♀.



A. testaceo-pilosa.
var. *Campana*. ♀.

♂. Per la piccolezza del suo capo, e per la forma del suo torace allungato

e depresso, con la base del metanoto infossata, quest'insetto differisce talmente dal ♂ della razza precedente che dovrebbe senza dubbio essere considerato come specie diversa se le rispettive ♀ non fossero tanto simili fra loro da potersi appena distinguere l'una dall'altra. Il primo segmento del picciuolo è appena debolmente concavo sulla superficie anteriore.



A. testaceo-pilosa.
var. *Campana*. ♂.

L'ho rinvenuta sulle falde del Vesuvio e nella Campania.

IV. *A. spinosa* mihi.

Questa forma, di cui conosco sole ♀, potrebbe forse considerarsi come specie distinta. Essa differisce dalle altre per la lunghezza e robustezza delle spine del metanoto, le quali sono alquanto curvate e dirette obliquamente in dietro ed in su, come pure per la brevità e spessezza del primo segmento del picciuolo. Il colore è nero, la statura variabile, mai molto grande (fino a 6 millim.); la scultura varia molto, per cui converrà dividerla in più varietà.



A. testaceo-pilosa.
var. *spinosa*. ♀.

a. Scultura della *semipolita*; nodi quasi levigati, addome sericeo, almeno sulla parte basale del primo segmento. Sardegna (*Gestro*).

b. Capo striato anteriormente, quasi levigato e lucente in dietro; torace appena sottilmente scabro, un po' lucente; metanoto, nodi e addome lucidi. Corsica (*Revelière, Simon*).

c. Una forma intermedia vive nei dintorni di Roma ove è stata raccolta