

III. Persia settent. (*Doria*), Gerusalemme (*Emery*); ♂ ♀.

VI. Milo (*Doria*); ♂.

VII. Cagliari (*Emery*); ♂.

IX. Tunisia (*Kerim*); ♀.

78. A. structor Latr.

Piemonte (*Ghiliani*), Torino (*Fea*), Voltri (*Doria*), Serravalle-Scrvia (*Ferrari*), Albissola (*Piccone*); ♂ ♀.

79. Pheidole pallidula Nyl.

Piemonte (*Ghiliani*), Genova, Borzoli, Voltri (*Doria*), Stazzano (*Ferrari*), Sardegna (*Gestro*); ♂ ♀ ♂.

80. Solenopsis fugax Latr.

Genova, Voltri (*Doria*), Stazzano, Serravalle-Scrvia (*Ferrari*), Spezia, Grotta dello Spadoni (*Kerim*); ♂ ♀ ♂.

81. S. orbula Em.

Ajaccio (*Emery*); ♂.

82. Cremastogaster scutellaris Ol.

Piemonte (*Ghiliani*), Genova (*Gestro*), Voltri (*Doria*), Serravalle-Scrvia (*Ferrari*), Albissola (*Piccone*), Roma (*Said*), Sar-

piceo; il capo è sottilmente, assai densamente striato in direzione longitudinale, con l'occipite granuloso, tutto opaco; il protorace è densamente granuloso, appena sensibilmente rugoso, il metanoto armato di due denti o piccole spine ben sporgenti; il picciuolo è sottilmente scabro; l'addome è assai finamente granuloso verso la base, non molto lucente. Lungh. 4-6 millim.

La ♀ si distingue da quella del N.º VII pel capo tutto densamente striato e per l'addome sottilmente scabro poco lucente, sparso di punti più grossi e profondi; il metanoto è armato di due denti.

Un ♂ del Sahara algeriano inviatami dal sig. Oberthur differisce dalle egiziane pel capo più levigato, un po' lucente sull'occipite, pel protorace distintamente rugoso. Una ♀ di Tunisia del Museo Civico si distingue per la mancanza dei denti del metanoto.

I ♂ dell'*A. barbara* variano poco; ne possesso delle forme I, II, IV e VII; la forma del corpo e la venatura alare sono quasi identiche; quelli della var. II sono più grandi; nella IV e nella VII la costa cubitale si divide presto; nella II, la trasversa cubitale manda qualche volta un ramo parallelo al margine anteriore dell'ala (esemplari di Lecce nella Collez. del Prof. Costa).