

Leptothorax Rottenbergi Em.

Hammam el Lif.

Conosciuto finora soltanto dell'Italia meridionale e delle isole.

L. exilis Em.

Galita, un esemplare molto scuro di tinta.

L. Nylanderi Foerst.

Galitone.

Tetramorium caespitum L.

Tunisi, Pantelleria.

Aphaenogaster Sardoa Mayr.

Utica.

A. testaceo-pilosa Luc. forma tipica.

Tunisi, Galita.

A. arenaria Fab.

El Gem.

A. barbara L.

Descrivendo in questi Annali (vol. XII, pag. 56-58 nota) le varietà a me note allora dell'*Aphaenog. barbara*, io rilevava la insufficienza dei materiali allora a mia disposizione. Un importante incremento va portato a questi materiali dagli esemplari della crociera del *Violante*, provenienti principalmente dalla Tunisia, ai quali se ne aggiungono altri presi nella stessa regione dal mio egregio amico sig. Errico Ragusa ed una forma raccolta dal marchese Antinori nello Scioa. Alcuni individui di altri luoghi mi furono ancora comunicati dal sig. Aug. Forel.

Gli esemplari di Tunisia si riferiscono ai tipi seguenti.

a. Identica alla var. I. della mia nota precedente; esemplari neri, col capo lucentissimo, denti del metanoto poco sensibili: Bir el Buita alcuni piccoli esemplari, Pantelleria, (Tunisi *Ragusa*).