

13. *M. viaticus*, razza *albicans* Rog.

Questa razza differisce dal tipo del *M. viaticus* principalmente per la scultura assai più debole, ed in ciò le forme orientali contrastano, pel loro capo lucente, con la forma opaca del *viaticus* che abita gli stessi paesi. Varia straordinariamente nel colore: così ve ne ha esemplari col capo rosso, o interamente rossi con l'addome nero (Tes); il colore rosso più chiaro e quasi testaceo può invadere la base dell'addome (Sceik-Osman) e qualche esemplare di questa località è interamente giallo-testaceo, con l'addome appena più scuro. Un esemplare del Cairo è interamente giallo pallido. A questa varietà si riferisce pure la forma da me noverata col nome di *Cataglyphis pallida* nel catalogo delle formiche del Museo Civico (v. questi Annali, IX, p. 366 e XII, p. 48) trovata in Persia e a Suez; è diffusa pure nella Siria d'onde ne ho veduto numerosi esemplari; gl'individui di questo paese hanno sovente l'addome più o meno bruno.

Il vero *M. pallidus* Mayr, come risulta dalla descrizione e da un esemplare tipico della mia collezione, proveniente dal viaggio di Fedtschenko, differisce per la squama del picciuolo più alta, come nel *M. bombycinus*. Io posseggo una formica molto affine al *M. pallidus*, inclusa in un pezzo di copale proveniente da Madagascar.

14. *Tapinoma* var. *nigerrimum*? Nyl.

Cairo; due esemplari ♂ un po' maltrattati.

15. *Ponera sennaarensis* Mayr.

Aden, Tes, Sceik-Osman. Trovata finora soltanto in Africa.

16. *Amblyopone denticulata* Rog.

Zante; questa specie fu scoperta appunto in quell'isola dal v. Kiesenwetter, ritrovata poi in più punti d'Italia (Firenze, Roma, Napoli).

17. *Myrmecina Latreillei* Curtis.

Zante.