

piccola statura con i nodi larghi, in ispecie il secondo, però molto meno che nel *T. meridionale*.

20. **T. simillimum**, Sm.

Aden.

21. **T. Doriae**, n. sp.

♂ *Pallide testacea, sparse pilosa, abdomine saepe brunneo, capite longitudinaliter rugoso, thorace nodisque levius coriaceo-rugulosis, abdomine nitido, clypeo carinato, laminis antennalibus ad occiput productis, antennis gracilibus, funiculi articulis longitudine parum latioribus, clava parum incrassata, thoracis dorso vix impresso, metanoto loco solito dentibus minutis, aliisque minutioribus prope insertionem petioli, hoc nodo primo ovali, longitudinali, secundo subgloboso, subtus obtuse dentato.*

Long. 3 — 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm.

Specie affine al *T. guineense* da cui differisce per la statura più gracile, per le antenne più lunghe e sottili con lo scapo che raggiunge l'occipite, gli articoli del funicello appena più larghi che lunghi e la clava poco ispessita, per la scultura più debole e non reticolata, la peluria meno abbondante e le spine del metanoto ridotte a piccoli denti; anche le spinette che fiancheggiano l'inserzione del picciuolo sono ridotte a minuti dentelli.

Assab; un altro esemplare proveniente da Tes differisce per i denti del metanoto ancora più piccoli.

**Monomorium**, MAYR.

Le specie di questo genere che abitano l'Africa e i lidi del Mediterraneo e del Mar Rosso possono essere distinte secondo il quadro seguente:

**Operarie.**

A. Capo fittamente coperto di granuli rilevati, lucido od opaco.

a. Articolo 1° del flagello quasi eguale al secondo (ex. Rog.).

*senegalense* Rog.