

- b. Articolo 1° del flagello eguale ai due seguenti presi insieme; gli altri articoli del funicello appena più larghi che lunghi; statura superiore ai 2 1/2 mm.
- a. Colore variabile, coll' addome sempre nero, almeno in parte.
- α. Capo allungato coi lati quasi retti, paralleli, l' occipite incavato; capo, torace e nodi rosso-chiaro, opachi, addome appannato.
bicolor Em.
- β. Capo meno allungato, coi lati rotondati, non incavato posteriormente, appena più largo verso l' inserzione delle mandibole che agli angoli dell' occipite.
1. Capo e torace di color bruno più o meno scuro, lucidi od opachi; metanoto appena indistintamente solcato sul dorso.
subopacum Sm.
- * Addome appannato, capo opaco, torace debolmente impresso fra mesonoto e metanoto
razza: *mediterraneum* Mayr.
- ** Addome lucido, capo più o meno lucido, torace più fortemente impresso
razza: *Salomons* Rog. (1).
2. Capo, torace e nodi picei, debolmente lucenti col metanoto largamente solcato sul dorso quasi per tutta la sua lunghezza.
Abeillei André, n. sp. (2)
3. Capo, torace, nodi e piedi rosso-chiaro; capo piuttosto lucente, addome lucido, torace fortemente impresso fra mesonoto e metanoto
venustum, Sm. (3).
- γ. Capo più allungato, allargato innanzi, distintamente incavato all' occipite; nero, addome lucido; torace rosso-chiaro, capo, nodi e zampe rosso-bruno.
niloticum, n. sp.

(1) Dubito forte che questa sia realmente la *Formica salomonis* di Linneo. Il gran numero delle forme affini e l' insufficienza della descrizione rende per lo meno dubbia la sinonimia da me proposta dell' *Aphaenogaster debilis* Walk. col *M. salomonis*. Diviene egualmente incerto a quale specie debba riferirsi il *M. thorense* Mayr, descritto sopra una ♀.

(2) *M. Abeillei*, n. sp.

♂ *Fusca seu nigro-fusca, mandibulis rufis, antennis pedibusque plus minusve rufo-fuscis, tarsi pallidioribus, abdomine nigro: parce pilosa, capite leviter coriaceo, antice striatulo, nitidiusculo, thorace et petiolo coriaceis, fere opacis, abdomine laevi nitido; capite fere quadrato, clypeo longitudinaliter sulcato, utrinque carinulato, oculis sat magnis; thorace inter mesonotum et metanotum leviter impresso, metanoto cum sulco longitudinali lato, sat profundo et fere usque ad mesonoti suturam producto; petioli nodo primo altiore secundo.*

Long. 3 - 3 1/2 mm.

A Dom. Abeille de Perrin apud Jaffa Palaestinae capta.

ANDRÉ.

(3) Forma molto ben caratterizzata per la grande statura (3 1/2 - 4 mm.) e pel colore rosso-chiaro con l' addome nero. Abita la Siria, ove l' hanno raccolta i sig. Piochard de la Brûlerie e Abeille de Perrin. Quest' ultimo ha scoperto la ♀ e una forma speciale di ♂ maggiore, con metanoto solcato e primo nodo bilobo, che verranno descritti in altro luogo dal sig. André.