

si trovano specialmente in Algeria, vengono a ricongiungere quei due estremi. Esemplari raccolti a Pantelleria (crociera del Violante 1877) hanno la scultura e le dimensioni del *mediterraneum*, mentre la forma del torace si avvicina di più al *Salomonis*.

24. **M. niloticum**, n. sp.

♀ *Sparsissime pilosa, nitida, subtilissime coriacea, obscure ferruginea, thorace rufo-testaceo, abdomine nigro, capite modice elongato, antice latiore, occipite late emarginato, clypeo medio sulcato, utrinque subcarinato, thorace impresso, nodis angustis, primo magis elevato.* — L. 3 - 3 $\frac{1}{3}$ mm.

Distinto da tutte le altre forme del gruppo per la figura del capo che è relativamente allungato, distintamente allargato innanzi, con l'*occipite largamente incavato*; questi caratteri gli danno quasi l'abito di un *Aphaenogaster* del gruppo della *testaceo-pilosa*. Cairo.

25. **M. luteum**, n. sp.

♀ *Lutea, sparse pilosa, abdomine apice saepe infuscato, capite elongato, postice subtruncato thoraceque subtiliter coriacea, nitidis, metanoto opaco, clypeo medio sulcato, utrinque subcarinato, thorace inter mesonotum et metanotum modice impresso, nodis magnitudine subaequalibus, primo magis elevato.* — L. 3-4 mm.

Ben caratterizzata dalla forma gracile, dalla dimensione ragguardevole e dal colore.

Ras Doumeirah, Aden.

26. **M. gracillimum**, Sm.

Aden, Sceik-Osman.

Varia molto nella grandezza. Gli esemplari più piccoli (2,2 mm.) hanno il capo ben più lungo che largo e i nodi più stretti; i più grandi (3 mm.) hanno il capo quasi più largo che lungo;