

il colore varia dal giallo testaceo al castagno chiaro, con l'addome piceo o nero. Posseggo un piccolo esemplare raccolto a Biskra in Algeria dal sig. R. Oberthür che è quasi nero; un esemplare quasi simile di Aden mi era stato mandato dal sig. André.

27. **Aphaenogaster pallida**, Nyl.; var. *subterraneoides*, m.

Zante. Un solo esemplare avente bensì la forma tozza della specie siciliana, ma col metanoto armato di denti, per cui si accosta all' *A. subterranea*. Parmi debbasi considerare come forma intermedia (1).

28. **A. testaceo-pilosa**, Luc. razza tipica.

Zante.

29. **A. structor**, Latr.

Zante, una sola ♂.

30. **A. barbara**, L.

1.° Forma ordinaria della penisola balcanica.

Zante.

2.° Forma simile alla var. *b* di Tunisia (Crociera del Violante 1877, questi Ann., XV, p. 393).

Tes.

3.° Razza *aegyptiaca*, Em.

Cairo. Alcuni esemplari differiscono pel colore tutto nero.

31. **A. arenaria**, F.

Cairo.

32. **Pheidole pallidula** Nyl.

Cairo ♂.

(1) Ho ricevuto dal sig. Léveillé un *Aphaenogaster* ♂ di Daya in Algeria che, pel torace senza spine, rassomiglia molto all' *A. pallida*, ma più gracile nell'insieme. Con questa ♂ trovavansi due ♀, anch'esse molto affini alla ♀ dell' *A. pallida*, ma più piccole e più gracili. La credo una razza locale dell' *A. pallida* cui darò il nome di *A. Leveillet*.