

17/2



ALCUNE FORMICHE

DELLA NUOVA CALEDONIA

PER

CARLO EMERY

Le formiche della Nuova Caledonia sono poco note, a tal segno che nei lavori pubblicati finora, io non ho saputo trovare che due sole specie indicate come provenienti da quelle isole: la *Formica (Polyrhachis?) carinata* del Fabricius e un *Leptomyrmea* segnato dal Mayr come varietà dell' *erythrocephalus* F., che però ho creduto opportuno separare specificamente. La presente contribuzione, quantunque ben piccola e limitata a poche forme, varrà pure a dare un qualche concetto della fauna mirmecologica della Nuova Caledonia. Questa fauna ha una *facies* assolutamente australiana, e sebbene sopra 12 specie 8 siano nuove, nondimeno per la più parte esse mostransi strettamente affini a forme note dell'Australia continentale; una si rinviene ancora nell' Indostan, due sono cosmopolite: è specialmente caratteristica la presenza del genere *Myrmecia*, le cui numerose specie sono tutte proprie dell'Australia e della Terra di van Diemen.

Debbo la comunicazione di questa piccola ma interessante raccolta al sig. E. Léveillé, il quale ha voluto concedermi di arricchirne la mia collezione: gliene esprimo qui i miei più vivi ringraziamenti.

Bologna, giugno 1882.

1. *Camponotus Gambeyi* n. sp.

♂ (minor?). *Nigra, antennarum flagello, tarsisque luteis; undique subtilissime coriacea, opaca, certa luce obscure coeruleo micans, cinereo pu-*