

3. *Polyrhachis exilis* n. sp.

♀ *Nigra, capite thoraceque longitudinaliter striatis, parce pubescentibus et breviter pilosis, abdomine pube densa aureo vel aeneo sericea, thoracis marginibus carinatis, suturarum loco profunde incisis, pronoti angulis anticis dente acuto productis, marginibus postice haud sinuatis, metanoti margine laterali antice lobulo elevato, postice spina flexuosa, obliqua, acutissima, intervallo quod ipsam a spina lateris alterius separat brevior; squama petiolari utrinque spina (spinis thoracis fere aequilonga) circum abdominis basin inflexa.*

Long. 4.5 — 5 mm.

È questa una forma molto vicina alla *P. Guerini* Rog. dalla quale ho esitato a separarla specificamente: è conforme ad essa per la configurazione generale, per i margini del torace carenati e profondamente incisi alle suture, pel protorace prolungato in un dente acuto ai suoi angoli anteriori, pel lobulo sporgente alla parte anteriore dei margini del metanoto; ne differisce pel margine laterale del pronoto non sinuoso nella sua parte posteriore, per le spine del metanoto e della squama più brevi e più gracili, per la pubescenza molto più breve e più scarsa nel capo e nel torace, mentre quella dell'addome è egualmente fitta come nella *Guerini*. In tutti gli esemplari esaminati, l'addome aveva un bel riflesso tra il bronzino e il dorato

4. *Plagiolepis gracilipes* Sm.

Specie diffusissima in tutta la zona torrida.

CAPO DELLE DUE SPECIE DI *Leptomyrmex*

*L. pallens.*

*L. erythrocephalus*



5. *Leptomyrmex pallens* n. sp.

♀ *Flavo-testacea, abdomine nigro; L. erythrocephali individuis pallidioribus haud dissimilis, verum minor, capite brevior, postice minus angustato, sed potius rotundato.*

Long. 6 — 7 1/2 mm.