

color metallicus obscure viridis, pedibus antennisque piceo-fuscis, flagello, tarsisque brunneis.

Long. 7 mm.

Questa bellissima specie è facile a distinguere dall' *E. metallicum* Sm. dell'Australia per i caratteri seguenti: il capo è più allungato, meno quadrato, un po' più ristretto in avanti e indietro, onde gli angoli occipitali divengono meno sporgenti, la sua superficie fronto-occipitale si continua fino all' articolazione del capo, senza presentare nessun vestigio di troncatura o di spigolo trasverso, mentre nell' *E. metallicum*, se si guarda il capo di profilo, si vede che forma quasi un angolo fra la superficie frontale e la occipitale: il clipeo è notevolmente sporgente in avanti, le sue rughe longitudinali sono più rade nel mezzo; la scultura del capo tende a formare rughe longitudinali solo fra le lamine frontali e sulle guancie, mentre nell' *E. metallicum* questa disposizione si estende anche al vertice; sul protorace la scultura tende a formare rughe trasverse, mentre nello *E. metallicum* è disposta piuttosto longitudinalmente; il primo e il secondo segmento dell'addome hanno una striatura molto più fina, per cui il secondo non ha il riflesso sericeo che osservasi nel *metallicum*, ma è debolmente lucente.

Ho veduto un solo esemplare di questa forma che rappresenta l' *E. metallicum* nella fauna neocaledonese.

9. *Ectatomma pulchellum* n. sp.

§ *Nigra, pedibus et antennarum scapo, exceptis basi et apice, piceis, flagellis, mandibularum marginibus, ano, trochanteribus, genibus, tarsisque testaceis; parcissime pilosa, pedibus antennisque pubescentibus, subopaca, mandibulis longitudinaliter striatis, capite (etiam clypeo) thoracique rude reticulato-foveolatis; clypeo antrorsum angulate producto, occipite leviter emarginato, vertice absque carina transversa, pronoti angulis anticis inferius in denticulos testaceos acute productis, thoracis dorso continuo, suturis vix distinctis, metanoto postice excavato, super coxas posticas utrinque tubere testaceo, petiolo levius reticulato, antice striato, nodo alto, supra rotundato, abdominis segmento primo subopaco, subtilius semicirculariter striato, secundo basi subtilissime transverse striato, apice lucido.*

Long. 3. 8 mm.

Ne ho visto un solo esemplare; questa specie è ben distinta da tutte