

foveole poco marcate, pel secondo segmento assai meno largo dell'addome: ne ho veduto tre esemplari.

TORACE E PICCIUOLO DEL *Meranoplus Leveillei*.



11. *Meranoplus Leveillei* n. sp.

♂ *Ferrugineo-fusca, abdomine rufo-testaceo, pube longa, tenui dense hirsuta; capite reticulato, clypeo nitido; thoracis lateribus margine elevato et spinis membranaceis obscure testaccis, margine inter spinas pellucido; pronoto angulis productis, mesonoto lobo laterali, spinisque membranaceis postice quatuor, quarum par medium multo brevius, mesonoto spinis magnis, sub spinis angularibus mesonoti insertis: petioli nodo primo cuneiformi, postice striato, secundo reticulato; abdomine laevi, nitido.*

Long. ♂ — 3.3 mm.

Pel numero e per la disposizione generale delle spine, la nuova specie si avvicina ai *M. pubescens* Sm., *fenestratus* Sm. e *hirsutus* Mayr.; differisce da tutti per la forma e la posizione delle spine del metanoto, che sono molto lunghe e robuste e si trovano precisamente al disotto delle spine laterali del mesonoto; i margini del disco costituito dal pronoto e dal mesonoto sono bensì pellucidi fra le spine, ma non mostrano finestre vitree; il primo segmento del picciuolo non è foggiato a squama come nei *M. pubescens* e *hirsutus*, ma più massiccio e superiormente si assottiglia a cuneo; per la natura della pelosità, il *M. Leveillei* si avvicina all'*hirsutus*.

12. *Solenopsis geminata* Fab.

Specie diffusa in tutta la zona torrida; un esemplare di colore pallido.