

Carattere generale della fauna mirmecologica barbaresca è la scarsità relativa dei Camponotidi e l'abbondanza dei Mirmicidi di diversi generi, caratteri questi che sono semplicemente l'esagerazione di quelli della fauna mediterranea. In fatti, vediamo già nell'Europa meridionale scarseggiare le specie del genere *Formica*, tanto abbondanti nelle regioni temperate dell'Europa e dell'America, le quali mancano del tutto in Africa (1). Anche i *Lasius* si fanno meno abbondanti a misura che si va verso il mezzogiorno, e solo poche forme giungono al Sud del Mediterraneo. I Camponotidi sono dunque rappresentati in Tunisia principalmente da alcune forme dell'immenso genere *Camponotus*, dai *Myrmecocystus* e dall'*Acantholepis Frauenfeldi*. Unico Dolico-deride finora trovato ivi è il *Tapinoma nigerrimum*. Invece i Mirmicidi si fanno ogni giorno più numerosi, a misura che le ricerche si moltiplicano: ciò dicasi specialmente dei generi *Aphaenogaster* e *Leptothorax*, il quale ultimo comprende una serie non piccola di forme mediterranee particolari, assai diverse da quelle dell'Europa temperata; si aggiungano a queste le poche specie dei generi tropicali *Monomorium* e *Cremastogaster* e la *Pheidole pallidula* che, con la loro abbondanza straordinaria, danno un aspetto particolare alla fauna mediterranea. Il genere *Myrmica*, rappresentato nell'estremo meridionale di Europa dalla sola *M. scabrinodis*, sembra mancare in Africa. — Benchè la *Typhlopone oraniensis* sia stata segnalata nella Francia meridionale e una forma affine (*T. Mayri* Joseph) si trovi nelle grotte della Carniola, pure i Dorilidei possono sempre essere riguardati come caratteristici della parte extra-europea del bacino mediterraneo.

Fra le novità descritte in questo lavoro è particolarmente importante un nuovo *Anochetus*, il secondo rappresentante del genere e di tutto il gruppo degli Odontomachidi nella fauna mediterranea.

Bologna Giugno 1884.

(1) L'indicazione che si trova nei libri, che la *F. fusca* trovisi in Algeria è probabilmente erronea. Nè io nè André, benchè abbiamo esaminato molte raccolte di formiche di Barberia, ci siamo mai imbattuti in una *Formica* di quella regione.