

*dilloti*, più sottile e più spianata indietro nel *Ghilianii*. Il colore dell'*A. Ghilianii*, almeno nel mio esemplare (mandatomi dal compianto Rosenhauer) è testaceo pallido con l'addome affumicato indietro, mentre quello della nuova specie è molto più scuro. — Tutti questi caratteri mi danno l'impressione che il genere di vita delle due specie mediterranee deve essere molto diverso.

Credo utile far seguire un quadro sinottico delle specie del genere *Anochetus*, del quale, oltre la specie descritta sopra, segnalerò tre altre forme nuove, per cui il numero delle specie conosciute trovasi portato da cinque a nove, che ho vedute tutte in natura, fuorchè l'*A. Nietneri* Rog.: le forme nuove saranno descritte in altro luogo.

- A.** Mandibole terminate con tre denti distinti, dei quali l'intermedio più piccolo.
- α. Squama del picciuolo troncata superiormente o bidentata, metanoto con due denti.
- Squama con due denti . . . . . 1. *A. Mayri* n. sp. (Antille: S. Tommaso).
- = Squama troncata . . . . . 2. *A. rectangularis* Mayr (Australia).
- β. Squama rotondata o acuminata; metanoto senza denti.
- α. Occhi grandi, nel mezzo dei lati del capo. 3. *A. Sedilloti* n. sp. (Tunisia)
- β occhi piccoli, nella metà anteriore del capo.
- \* Statura più grande (5-6 mm), mandibole distintamente dentate al loro margine infero-interno . . . . . 4. *A. Ghilianii* Spin. (Andalusia).
- \*\* Statura più piccola (3 1/2-4 mm), margine infero-interno delle mandibole indistintamente dentato.
- Clipeo distintamente incavato nel mezzo . . . . . 5. *A. punctiventris* Mayr (Indostan, N. Caledonia).
- = Clipeo quasi piano . . . . . 6. *A. Graeffei* Mayr (Isole Samoa).
- B.** Mandibole terminate da due soli denti, il dente intermedio essendo fuso con l'inferiore o appena visibile.
- c. Peduncolo con una spina ottusa . . . . . 7. *A. Nietneri* Rog. (Ceylan).