

d. Peduncolo senza spina.

- Pronoto levigato nel centro, vertice levigato . . . . . 8. A. *princeps* n. sp.  
(Giava).
- = Pronoto grossolanamente rugoso, vertice striato . . . . . 9. A. *Beccarii* n. sp.  
(Sumatra).

**Cardiocondyla nuda** Mayr (*Leptothorax nudus*).

Un solo esemplare di Tunisi (G. e L. Doria). Esso è perfettamente identico con un esemplare tipico delle isole Tonga, che ho ricevuto dal Mayr. Le specie del genere *Cardiocondyla*, sebbene sembrano rare, forse pel modo nascosto di vivere che rende difficile trovarle, hanno una diffusione geografica vastissima. Così la *C. elegans* Em. si estende dal littorale europeo del Mediterraneo occidentale fino nel Turkestan: la *C. Emeryi* For., scoperta nelle Antille, fu ritrovata in Siria; la *C. nuda* era stata trovata finora nell'Oceania e nell'Indostan; eccola ora anch'essa a far parte della fauna mediterranea. — Forse sarebbe lecito sospettare che queste piccole formiche siano state in alcuni luoghi trasportate per mezzo di vasi di fiori o con altre merci.

**Leptothorax tuberum** F., razza **exilis** Em.

Galita (Violante), Tunisi (G. e L. Doria).

**L. tuberum** razza **Nylanderi** Foerst.

Galitone (Violante).

**L. tuberum** razza **interruptus** Schenk.

Tunisi (G. e L. Doria).

**L. nigrita** Em., var. **flavispinus** André.

Tunisi (G. e L. Doria); trovata finora a Giaffa in Siria.

**L. Rottenbergi** Em.

Tunisi (G. e L. Doria). Gerba (Violante).

**L. angulatus** Mayr.

Gerba (Violante).