

Monomorium Salomonis L.

Comune in Tunisia.

M. Pharaonis L.

Ho nella mia collezione un esemplare di Oran: è probabile che questa specie cosmopolita si trovi pure in Tunisia.

Aphaenogaster testaceo-pilosa Luc.

Una sola forma, quella tipica, di grande statura è stata finora trovata in Africa. Le altre razze sembrano proprie di diverse regioni dell'Europa meridionale. Non ho veduto individui sessuati africani. — Durante la mia dimora in Sardegna, benché mi trovassi sempre assente nei mesi estivi, pure ho potuto prendere ♂ e ♀ della grande forma tipica e della razza *spinosa* var. *a* (Formiche del Museo Civico II, questi Annali XII, pag. 54). Le ♀ differiscono poco da quella da me figurata della razza *campana*, se non che quella della razza tipica è più grande e più robusta, col nodo del 1.° segmento del picciuolo più ispessito. — Il ♂ di questa forma è simile a quello del Portogallo da me descritto (l. c.); quello dell'*A. spinosa* ha il torace più alto, di figura intermedia fra quella dell'*A. testaceo-pilosa* tipica e dell'*A. semipolita*.

A. sardoa Mayr.

Pare comune in Tunisia: io non ebbi occasione di trovarla in Sardegna, ma vi è stata raccolta presso Oristano dal prof. Costa.

A. crocea André.

Descritta dal suo autore sopra un esemplare di Oran, questa forma è stata presa in pochi esemplari a Tunisi (G. e L. Doria). Sembra una forma intermedia fra le *A. sardoa* e *splendida*.

A. subterraneo-splendida Em. e For.

Una ♀ di Tunisi (G. e L. Doria) simile a quella da me raccolta sul M.^{te} Pellegrino presso Palermo.