

Questa formica è descritta dal Forel sopra esemplari anche di Sumatra, come razza del *C. Kubaryi*, Mayr. Dietro accurato confronto coi *C. irritans* e *Kubaryi*, credo doverlo considerare come forma intermedia per la scultura fra quei due. Il *C. Kubaryi* non è a mio parere che una razza oceanica del *C. irritans*.

3. **C. exasperatus** Sm.

Nias, Kampun Fadoro, Bawolovalani ♂.

Gli esemplari di questa provenienza differiscono da quelli di Borneo per la forma della squama, che non è incisa al margine superiore, ma terminata da una lamella tagliente, leggermente incavata superiormente nei grandi esemplari (1).

4. **Colobopsis pubescens** Mayr.

Sumatra, Siboga ♀. Mi rimane qualche dubbio sulla determinazione di questa specie.

5. **Polyrhachis Modiglianii** n. sp., Tav. IX, fig. 1.

♀. Nigra, opaca, creberrime punctata, longe albido-pilosa, capite et thorace pube argentea, adpressa parce vestitis, abdomine aureo-sericeo. Caput clypeo subcarinato, fronte lata. Thorax supra planus, lateribus marginatus, margine loco suturarum inciso, sutura pro-mesonotali distincta, meso-metanotali obsoleta, pronoti angulis anticis vix prominulis, nonnunquam rotundatis, lateribus pone medium sinuatis, mesonoti transversi margine laterali irregulariter sinuato, saepe bilobo, metanoto utrinque spina longa subrecta, oblique retro, sursum et extro versa, superficiebus basali et declivi continuis. Squama spinis duabus longis, circum abdominis basin curvatis, margine superiore inermi. Pedes et scapi pilosi. L. $4\frac{2}{3}$ mm.

(1) Nelle ocree della *Korthalsia echinometra* raccolta a Perak nella penisola di Malacca, dal P. Scortechini, il prof. Beccari ha rinvenuto alcuni esemplari frantumati di una nuova varietà del *C. contractus* Mayr che chiamerò var. *Scortechinii* in omaggio alla memoria di chi lo mandò. Differisce dal tipo della specie per la statura più grande (massimo 11 mm.), la scultura più superficiale, per cui l'insetto apparisce più lucente, e la punteggiatura più distante, sparsa fra le maglie della scultura reticolata. Sulle mandibole, la punteggiatura sottile, che trovasi nel tipo fra i grossi punti, è quasi mancante e limitata alla base della faccia esterna, mentre il resto delle mandibole è lucente. Il capo è ancora un poco più depresso in avanti che nel *C. contractus*. Il torace ha ordinariamente una impressione distinta fra il mesonoto e il metanoto; il profilo di questo segmento forma un angolo meno ottuso.