

Sumatra, Siboga ♂.

Si avvicina molto alla *P. Guerini* Rog.; differisce da essa e dalle altre specie affini per la forma del pronoto, i cui angoli anteriori sono appena proeminenti in forma di un piccolo dente (talvolta ottuso e anche spesso mancante) e per la piccola statura. Un esemplare di Borneo, Sarawak alquanto detrito, che considerai da prima con dubbio come varietà della *P. Guerini* appartiene pure alla nuova specie, la quale rappresenta nelle isole della Sonda il gruppo australiano della *P. Guerini*.

Una ♀ di Nias, Lelemboli è simile alle ♂ qui descritte per scultura e pubescenza; ha gli angoli del pronoto molto ottusi, le spine del metanoto e della squama più corte. È lunga 5 $\frac{3}{4}$ mm. La riferisco con dubbio alla medesima specie.

6. ***P. nigropilosa*** Mayr.

Nias, Gunung Sitoli, Bawolovalani ♀. Conosciuta finora soltanto di Borneo.

7. ***P. Mayri*** Rog.

Sumatra, Siboga, ♀.

8. ***P. striata*** Mayr? var.

Riferisco con dubbio a questa specie una ♀ di Nias, Kampun Fadoro, nella quale la striatura del capo e del torace è molto più debole che nelle ♂ da me vedute finora.

9. ***P. armata*** Le Guill.

Sumatra, Siboga ♂.

10. ***P. phyllophila*** Sm.

Sumatra, Siboga ♀.

11. ***P. bihamata*** Drury.

Sumatra, Siboga ♀.

12. ***P. bellicosa*** Sm.

Sumatra, Siboga ♀.

13. ***Oecophylla smaragdina*** F.

Sumatra, Padang; Nias, Gunung Sitoli, Kampun Fadoro ♂ ♀.

14. ***Plagiolepis longipes*** Jerd.

Sumatra, Siboga; Nias, Gun. Sitoli ♀.

15. ***Acropyga acutiventris*** Rog.

Sumatra, Siboga ♀.