

1 e 3, con le 4 e 5, le quali ultime rappresentano l'estremo dell'addome della *D. furcata* secondo il tipo della specie che appartiene al Museo di Berlino (1). Anzitutto la forma generale è diversa, la fessura dell'estremità essendo più larga nella *D. furcata* e le due punte più lunghe e più acute. I margini rilevati offrono nella *D. furcata* un semplice rilievo angolare verso la base, mentre nella nostra specie questo rilievo assume la forma di un lobo staccato e tra esso e l'estremità della piastra trovasi un secondo rilievo ad angolo ottuso. La carena longitudinale sporgente che trovasi su ciascuna metà della piastra termina nelle due specie con un rilievo angolare; però, nella ♀ della *T. punctata*, trovasi nel prolungamento di questa carena all'indietro una sporgenza dentiforme che manca nella *D. furcata*. Altre piccole differenze si rileveranno dalle figure. — Il colore è castagno scuro, con i piedi un poco più chiari; l'ipopigio quasi nero.

Come negli esemplari delle *D. glaberrima* e *furcata* descritti dal GERSTACKER, anche nel mio insetto mancano gli articoli terminali di tutti i tarsi; sembra quindi che questo sia un fatto normale. L'ignoranza assoluta nella quale ci troviamo rispetto ai costumi di queste formiche non permette di dare una interpretazione qualsiasi di questa condizione singolare. Da quanto mi scrive il Sig. PERINGUY, i tre esemplari finora raccolti al Capo di Buona Speranza furono rinvenuti nella stagione invernale in mezzo alle *Typhlopone*, sotto a cumuli di letame dove queste formiche si erano forse ritirate per cercare una temperatura più mite. Poichè le *Typhlopone* costituiscono società popolateissime e menano vita lucifuga, si comprende di leggieri che gravi difficoltà si oppongano alla esplorazione dei loro vasti e profondi domicilli sotterranei, dai quali non vengono fuori, se non costrette da inondazioni o da altre potenti cause.

Comunque siasi, è fuori dubbio che la nuova *Dichthadia* che ho descritta sopra è la ♀ della *Typhlopone punctata* Sm. È meno evidente che il *Dorylus helvolus* L. sia il ♂ della medesima specie; però, poichè è provato che altri *Dorylus* si trovano nei nidi di altre specie di *Typhlopone*, ritengo più che verosimile che il *D. helvolus* deve vivere in condizioni consimili. Ora essendo questo il solo *Dorylus* che sia stato trovato finora al Capo di Buona Speranza, dove è comune la *T. punctata* il solo rappresentante noto del genere *Typhlopone* in quel paese, credo che si possa senza tema di errare ammettere che questi due insetti siano forme spettanti ad una stessa specie.

---

(1) Il Dott. H. DEWITZ ha avuto la somma cortesia di eseguire questi disegni. Egli ha pure esaminato il torace di questo prezioso esemplare e mi scrive che non vi ha trovato nessun vestigio di rudimenti alari.