

- Dorylus helvolus* L. Shuck. Monogr. Doryl. p. 29. ♂.
Typhlopone punctata Sm. Cat. Br. Mus. Formicid. p. 112 ♀.
— *europaea* Rog. Berl. Ent. Zeit. 1859 p. 248 ♀.
Dorylus planifrons Mayr Novara Reise Formic. p. 74. fig. 21 ♂.
— *helvolus* (L.) Emery Bull. Soc. Ent. Ital. Anno XIX p. 344 ♀.

Dorylus juvenculus Shuck . . . hab. Africa bor. et trop. Syria, India

Dorylus juvenculus Shuck l. c. p. 32 ♂.

Typhlopone oraniensis Luc. Expl. Sc. Alg. III. p. 302. ♀.

Dorylus badius Gerst. Peters Reise Mossamb. p. 499. ♂.

? *D. labiatus* Shuck. l. c. p. 33 ♂.

? *D. hindostanus* Sm. Cat. Brit. Mus. Dorylid. p. 3 n. I, f. 1, ♂.

Dorylus laevigatus Sm. hab. Borneo Java Sumatra.

Typhlopone laevigata Sm. Cat. Br. Mus. Formicid. p. 112. n. VIII.
f. 4. ♂.

? *Dichthadia glaberrima* Gerst. Stett. Ent. Zeit. 1863. p. 76 ♀.

? *Dorylus Klugi* (Hagenb.) Emery. Ann. Mus. Civ. Genova. (2) vol. V,
p. 448 tav. I, f. 10 ♂.

Per le altre specie di *Dorylus* e di *Typhlopone* e per la *Dichthadia furcata* non è possibile finora stabilire rapporti di sinonimia.

Bologna, giugno 1887.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XI.

1. *Dorylus helvolus* L. ♀ (*Dichthadia*) veduta di sopra.
2. Capo, torace e peduncolo della medesima veduti di fianco e più fortemente ingranditi: *a* fossetta che segna il luogo dell'occhio composto; *b* e rudimenti delle ali; *d* stigma del metatorace.
3. Estremità dell'addome veduta di fianco.
4. Estremità dell'addome delle *Dichthadia furcata* Gerst. veduta dal dorso.
Questa figura e la seguente sono eseguite secondo disegni del Dott. H. Dewitz.
5. Estremità dell'addome della stessa veduta di fianco.
6. *Dorylus helvolus* L. ♀ (*Typhlopone punctata* Sm.). *a* grande esemplare; *b* piccolo.