

1889.]

REPÚBLICA DE COSTA RICA.

45.

Estudios sobre las hormigas de Costa Rica

1894f

POR

CARLOS EMERY,

PROFESOR DE ZOOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA (ITALIA).

I.

HORMIGAS RECOGIDAS EN 1889,

POR

ANASTASIO ALFARO.

WILLIAM L. BROWN

1. ECITON HAMATUM Fab.
Jiménez ♀.
2. E. FORELI Mayr.
Jiménez, S. Carlos, Pozo Azul, Alajuela. ♀.
3. E. VAGANS Ol.
Alajuela.
4. E. CRASSICORNE Sm.
Alajuela.
5. E. MEXICANUM Rog.
Liberia.
6. E. COECUM Latr.
Alajuela, Jiménez, etc. (Véase también el n. 13).
7. E. OMNIVORUM Kollar.
Jiménez, Alajuela.
8. E. SPINinode n. sp.

♀ *Opaca, ubique confertissime punctata, cum punctis majoribus piligeris; brunnea, mandibulis pedibusque pallidioribus; capite lato, postice truncato, angulis rotundatis, metanoto mutico, modice depresso, petioli nodis subaequalibus, longioribus quam latioribus, primo subtus spina acutissima (in ♀ minore tantum dente acuto) instructo, unguiculis dentatis.*

Long. $3\frac{1}{2}$ - $6\frac{3}{4}$ mm.

Alajuela.

Esta especie se aproxima mucho á la *E. omnivorum*, de la que difiere por la forma del cuerpo, por su menor tamaño, por su cabeza más truncada y menos redondeada en la parte posterior, por las antenas un poco más gruesas, por los nudos del pedúnculo abdominal algo más estrechos, y especialmente por la espina aguda del primero de éstos; pero sin embargo, en los ejemplares más pequeños es menos saliente y reducida á un pequeñísimo diente.

9. E. PIOSUM Sm.
San Carlos.
10. E. ALFAROI n. sp.
♀ *Pilosa, rufo-testacea, mandibulis, ore et marginibus fovea antennalis*