

fusca, ab domine pedibusque pallidis, nitida. Caput latitudine sua maxima longius, postice late emarginatum, angulis posticis (prae certim in ♀ minoribus) acuminatis, sparse punctatum et in ♀ maxima supra, circum punctula piligera, foveolis latis, valde superficialibus, certa luce tantum conspicuis impressum, oculis minutissimis, testaceis, mandibulis striatis et disperse punctatis, margine masticatorio obliquo, dentulo, antennis elongatis, scapo apice parum incrassato, haud dilatato, flagelli articulis penultimis longioribus quam crassioribus. Thorax compressus, elongatus, pronoto antice cum carinula transversa, sutura meso-metanotali leviter impressa, metanoto postice brevissime truncato, disco pro-mesonotali sparse grosse punctata, nitido; metanoto et pleuris subopacis, punctis elongatis, magis minusve in rugas confluentibus. Abdomen nodis pedunculi subaequalibus, parum longioribus quam latoribus, primo punctis obliquis impresso. Unguiculi simplices. Long. 3-5 $\frac{1}{4}$ mm. Antennarum operariae maxima scapus $\frac{4}{5}$ mm., flagellum $1\frac{3}{4}$ mm.

S. José.

Se aproxima á los *E. Specazzinii*, *Hetschkoii*, *angustinode*, *nitens*, y *californicum*; difiere del primero por el color testáceo; de todos por el torax estrecho y por las antenas largas con el escapo apenas engrosado en el apice.

11. *E. (LABIDUS) BURCHELLI* Westw.

Alajuela ♂. Según las observaciones de F. Müller es el ♂ de la *E. Foreli*.

12. *E. (L.) ESENBECKI* Westw.

Alajuela ♂.

13. *E. (L.) SERVILLEI* Westw.

Alajuela ♂.

El señor Alfaro me ha mandado cierto número de ejemplares de este *Labidus* junto con muchos ♀ de la *E. coccum*, á cuya especie debe referirse como ♂. Creo que el *L. Sayi* Hald. no sea específicamente diverso del *L. Servillei*, del cual difiere apenas por el artejo bacilar de los tarsos posteriores menos grueso.

14. *CENTROMYRMEX ALFAROI* n. sp.

♀ *Obscure ferruginina, thorace pedibusque rufescentibus, nitidissima, sparse pilosa, haud pubescens. Caput latitudine maxima brevius, laeve, punctis magnis dispersis impressum, foveis antennalibus subtiliter punctatis minus nitidis, clypeo convexo, medio elevato, sine carinulis; mandibulae marginem masticatorio denticulato, lateribus sulco obliquo, ut in Ponera sulcata et affinibus decurrente. Thorax supra haud impressus, punctis foveiformibus dispersis sculptus, mesonoti disco postice utrinque depresso et apice angustato, metanoto antice fortiter compresso, superficie basali in declivem sensim transcente, pleuris minus disperse grosse punctatis, metapleuris striatulis. Abdomen pedunculo supra rotundato, antice superficie obliqua subplana, nitidissima, subtus antice eminentia compressa, obtuse angulata; segmenta reliqua nitida, punctis minutis sparsis et alis sparsissimis majoribus oblique impressis, piligeris. Long. 7 $\frac{3}{4}$ mm.*

Alajuela. Un solo ejemplar privado de antenas.

15. *TYPHLOMYRMEX ROGENHOFERI* Mayr.

raza *robustus* n. st.

♀ *A typo speciei differt statura majore (4 $\frac{1}{2}$ -5 mm.), sculptura mesonoti transversim striati et nodo pedunculi breviore antrorsum, minus angustato.*

Alajuela.

En los ejemplares del Pará y Sta. Catarina, esto es, en la forma típica del *T. Rogenhoferi* el pronoto y el mesonoto son más bien fuertemente pun-