

*squama superficie dorso-postica convexa, confertim transverse acute striata, nitida.* — Long. 8-8½ mm. — Alajuela y Jiménez.

36. P. VILLOSA Fab.

Alajuela, Jiménez.

37. P. FOETIDA Ol.

Alajuela, Jiménez.

38. PONERA STIGMA Fab.

Alajuela.

39. P. NITIDULA n. sp.

♀. *Nitida, sparse pubescens et vix pilosa, nigra, mandibulis, flagellis pedibusque ferrugineis. Caput latitudine sua maxima circiter quarta parte longius, haud crebre, subtilissime punctatum, mandibulis laevibus, sparse punctatis, margine masticatorio irregulariter 10-II denticulato, clypeo integro, medio obtuse carinato, laminis frontalibus antice dilatatis, fronte inter ipsas haud sulcata, sed plana, elevata, crebrius punctata. Thorax subtilius et sparsius punctatus, ante metanotum leviter impressus, hoc modice compresso, postice abrupto, superficie declivi longiore quam basalis: Abdomen squama pedunculari lata, subrotunda, superne subtiliore, antice convexa, postice planata.* Long. 3½ mm.

40. LOBOPELTA PUSILLA n. sp.

♀. *Fusca, mandibulis, antennis pedibusque rufescens, laevis et nitidissima, sparse breviter pilosa, capite elongato, lateribus subparallelis, mandibulis angustis, acutis, antennarum scapo modice longo, robusto, flagello crasso, cuius articuli penultimi crassitie sua haud longiores sunt. Thorax elongatus, metanoto longo, postice vix breviter declivi, ibique concavo et utrinque ad latera articulationis pedunculi obtuse subdentato. Abdomen pedunculo longiore quam latiore, antice angustato, supra oblique truncato.* Long. 2½-3 mm.

Jiménez.

Se aproxima mucho á la *L. sustralis* Em. de la que difiere por ser más pequeña y por sus antenas relativamente más gruesas, con los artejos del flagelo más cortos que anchos. Es la más pequeña de las *Lobopeltas* hasta ahora conocidas.

41. LEPTOGEYS PUNCTATICEPS n. sp.

♀. *Nigra, nitida, pedibus fuscis, tarsis, mandibulis et flagellis ferrugineis, pilosa, capite etiam pubescente. Caput crebre, subtiliter punctatum, punctis pubescentiam gerentibus, paucisque majoribus ex quibus oriuntur pili erecti. Mandibulae nitidae, sparse punctatae. Antennae gracilis, articulis penultimis dimidio crassioribus quam longioribus, flagelli 2º maximo, duobus sequentibus una breviore. Thorax elongatus, sutura meso-metanotali leviter impressa, nitidus, supra punctis magnis, piligeris, sparsis, pleuris longitudinaliter foveolato-rugosis et confuse subtilius oblique rugulosis. Abdomen segmento petiolari longo, comppresso, antrorsum distincte angustato, latitudine maxima longiore, supra sparse punctato, laterum parte superiori oblique foveolato-rugosa, postice abrupte truncato, laevi, margine postero-supero medio distincte angulose producto; segmentis reliquis nitidissimis, punctis piligeris sparsis, minutissimis. Pedes graciles et scapi pilosi.* — Long. 6½ mm. Jiménez, un ejemplar.

La puntuación de la cabeza y de las mandíbulas, lo mismo que la forma del pedúnculo y la proporción de los artejos de las antenas, hacen á esta forma fácil de reconocer.

42. ANOCHECUS (STENOMYRMEX) EMARGINATUS Fab. raza STRIATULUS Em. Ann. Soc. Ent. Fr. 1890.

La estría de la cabeza es más extensa hacia atrás y sobre todo más fina y perfectamente regular, lo que da á las partes estriadas un aspecto mate