

rotundato, haud elevato, ante metanotum impressione brevi, profunda, metanoto superne vix planato, postice angustiore, angulo inter dorsum et faciem declivem obtuso, rotundato. Abdominis segmentum pedunculare 1. linea dorsti antice subrecta vel vix subconcava, dorso aliquantulum planato, lateribus tamen haud marginato, latitudine maxima circiter duplo longiore. Long. 4-4 $\frac{1}{3}$ mm.

♀ Color operariae, tamen fascia abdominis latiore et fere nigra, vertice, pronoto postice, mesonoti lateribus et femoribus posticis brunno-maculatis. Sculptura ut in ♀, mesonoto tamem punctis majoribus, multo minus crebris, scutello sublaevi, nitido. Caput magis elongatum, lateribus minus arcuatis. Alae leviter fuscatae, stigmate fuso. Long. 6-6 $\frac{1}{2}$ mm.

Jiménez. (En Alajuela habita las espinas de las Acacias.)

Por el color y tamaño, recuerdo la *P. flavidula* Sm. de la que se distingue bien por la punteadura espesa de la cabeza y por la impresión profunda del torax; en algunos ejemplares el perfil dorsal del 1^{er} segmento del pedúnculo es ligeramente cóncavo en su parte anterior; sin embargo esta forma del pedúnculo se observa aunque con poca frecuencia en la *P. flavidula*. (Lám. II, fig. 4.)

52. PS. SUBTILISSIMA n. sp. Lám. II, fig. 7.

♀ Testacea, meso et metathorace atque femoribus posticis obscurioribus, abdominis segmenti 3. (1. post pedunculum) dimidio basali et segmentis sequentibus fuscis, opaca, confertissime et subtilissime punctata, pube subtili, albida, sericeo-micans, pilis erectis vix ullis. Caput lateribus parallelis, latitudine sua maxima (cum mandibulis) fere duplo longiore, postice truncatum, oculis permagnis, ovatis, laminis frontalibus longis, clypeo cum lobo angusto, porrecto. Thorax angustus, dorso subrecto, sutura meso-metanotali vix impressa, metanoto postice angustato, abrupte truncato et leviter excavato. Abdominis petioli segmentum 1. modice elongatum, dorso longitrosum convexo; 2. latitudine maxima vix brevius. Long. 3-3 $\frac{1}{2}$ mm.

♀ Operariae similima et paulo major, capite magis elongato, plus duplo longiore quam latiore: alae desunt. Long. 4 $\frac{1}{4}$ mm.

Alajuela: en algunas espinas de una acacia habitada por la *P. Belti*.

Se aproxima á la *P. sericea* Mayr de la cual difiere, no sólo por el color, sino sobre todo por la forma más débil y alargada; por la cabeza más estrecha y por los ojos proporcionalmente menos grandes. (Véase la Lám. II, fig. 6.)

53. PS. SERICEA Mayr.

Alajuela, Liberia ♀.

54. TETRAMORIUM AUROPUNCTATUM Rog.

Alajuela.

55. MEGALOMYRMEX FORELI n. sp. Lám. I, fig. 3.

♀ Rufo-testacea, nitidissima, abdome obsoetu, pilosa, haud pubescens. Caput ovatum, posterius haud conspicue angustatum, occipite lateribus convexo, limite postremo cum margine elevato obsoleto (vel vix angustissimo), laminis frontalibus postice evanescentibus, nec in rugulam arcuatam, foveam antennalem circumscribentem productis, fovea ipsa longitrosum striatula; antennae articulis flagelli 3-8 crassitie sua haud dimidio longioribus. Thorax mesonoto gibboso, metanoto postice ad receptionem pedunculi profunde excavato, utrinque gibbere, seu tuberculo lato, aliquantum compresso, apice rotundato instructo. Abdominis pedunculi segmentum 1. superne antice concavum, subtus basi vix denticulo minutissimo, lateribus stigmatibus prominulis; 2. basi subtus plerumque dente minuto. Long. 6-8 mm.

Alajuela y Jiménez.