

La forma de las fosas antenales que no tienen estrías regularmente concéntricas y el occipucio convexo, con el borde posterior sutilmente marginado, distinguen bien esta especie de las congéres.

56. *APHAENOGASTER PHALANGIUM* n. sp. Lám. I, fig. 6 y 7.

♀ *Gracilis, pedibus antennisque valde elongatis, pilis crassis, obtusis conspersa, ferruginea, opaca, abdomine (excepto pedunculo) nitido, fusco. Caput elongatum, retrorsum conice angustatum, margine collari elevato, nigricante, confertissime punctatum, antice longitrosum rugosum, mandibulis striatis et sparse punctatis, clypei margine antico medio subrecto. Thorax similiter confertim punctatus, rugosus, rugis in metanoto transversis, sutura meso-metanotali impressa, metanoto omnino mutico. Abdomen pedunculi segmento I. opaco, antice breviter petiolato, supra nodo elongato, 2. ovali, antice angustiore, minus opaco, minus confertim et subtilius punctato, foveolis setigeris distinctis; reliquis segmentis praeter foveolas setigeras, vix sculptis, nitidis. Pedes opaci, confer-tissime punctati.* Long. $6\frac{1}{2}$ -7 mm.; scapi $2\frac{1}{2}$; pedis postici extensi 9.

♂ *Ferrugineus, quod sculpturam, colorem et nitorem operariae similis, capite postice similiter conice angustato et marginato, mandibulis acute denticulatis, oculis permagnis, thorace scutello gibboso, elevato, metanoto depresso, mutico, pedunculi segmento 1º breviore quam in operaria. Alae flavescentes, breves, anticae in specimine uno cella cubitali una clausa, in altero costa trasversa pallidissima ramos costae cubitalis connectente.* Long. $6\frac{1}{2}$ - $6\frac{3}{4}$ mm. Ala ant. $4\frac{1}{2}$.

Alajuela, Jiménez.

57. A. *ARANEOIDES* n. sp. Lám. I, fig. 8.

♀ *Praecedenti proxime affinis et potius stirps ejusdem quam species diversa. Abdomine ferrugineo, opaco et confertissime punctato atque metanoto tuberculis minutis instructo agnoscenda.* Long. 7- $7\frac{1}{2}$ mm.; Scapi fere 3, pedis postici $10\frac{1}{2}$.

Alajuela, Jiménez.

Estas dos especies afines entre sí, representan en América el grupo *Ischnomyrmex*, pero difieren por la forma de los orientales.

58. *MONOMORIUM PHARAONIS* L.

Alajuela, Jiménez.

59. M. *CARBONARIUM* Sm.

San José.

Los ejemplares costarricenses se parecen mucho á los de la Isla de Santo Tomás, recogidos por Forel; sin embargo, su metanoto es todavía más manifiestamente tuberculado.

60. *PHEIDOLE ABSURDA* Forel. Lám. I, fig. 9, 10 y 11.

Alajuela, San José y Liberia.

Esta especie está representada por dos distintas variedades de color; en la una el soldado es todo de un color oscuro, con las antenas y las patas más claras y con el margen anterior de la cabeza rojizo; en la otra el cuerpo es moreno, la cabeza de un color rojizo claro, teniendo el margen de la boca y las mandíbulas rojo oscuro. Describo la ♀ que no era conocida.

♀ *Fusco-ferruginea, antennis, pedibus et pedunculo dilutioribus, occipe et abdomine abscurioribus, nitida, pilosa. Caput postice sine collo, occipite obtuse truncato, dictincte emarginato, nitidum et laeve, clypeo lateribus striato, foveis antennalibus cum rugis arcuatis concentricis, rugisque nonnullis prope oculos longitudinalibus, mandibulis striatis, antennarum flagelli articulis 2-8 crassitie sua haud brevioribus. Thorax pronoto haud tuberculato, laevi, vix margine antico punctulato, mesonoto convexo, laevi, sine impresione mesopleuris et meta-*