

98. C. MACULATUS Fab. Syst. Ins. raza SIMILLIMUS Sm.

Alajuela.

99. C. SEXGUTTATUS Fab.

Alajuela.

100. C. SEXGUTTATUS raza LANDOLTI Forel var.

Jiménez, 3 ejemplares con el abdomen manchado.

101. C. NOVOGRANADENSIS Mayr.

Alajuela, Jiménez.

102. C. SENEX Sm. raza típica.

Jiménez, Liberia.

103. C. SENEX raza PLANATUS Rog. var.

Alajuela y otras localidades. Diversas variedades de color, con la cabeza y el torax ordinariamente de color rojo oscuro, ó sólo oscuros; la pubescencia del abdomen es más espesa y dorada que en el *planatus* típico y se aproxima á la *auricomus*. El señor Alfaro ha observado que este *Campnotus* vive sobre las Acacias espinosas, junto á las *Pseudomyrmes* y habita las espinas de las ramas secas abandonadas por estas últimas.

104. C. CRESSONI André.

Alajuela, Jiménez.

105. C. RECTANGULARIS n. sp.

♀ *Opaca, sparsissime brevissimeque pubescens et vix pilosa, ubique confertissime punctata, pedibus et scapis subtilius punctatis, subnitidis et magis pubescentibus: testacea, vertice et abdominis basi pubescentibus, flagellis, palpis, tibiis tarassisque nigricantibus. Caput in ♀ minore subquadratum, in majore latius quam longius, antrorsum angustatum et rotundatum, oculis repositis, clypeo haud carinato, lobo brevissimo, rotundato, integro, mandibulis brevibus, nitidis, sparse punctatis. Thorax dorso planato, lateribus et antice margine acuto, suturis distinctis, haud impressis, pronoto lato, angulis anticis obtusis, metanoti postice et lateribus abrupte truncata facie basali subquadrata. Abdomen squama lata, subtili, postice subplana, antice leviter convexa, supra rotundata, margine acuto. Pedes et scapi haud pilosi.* Long. $4\frac{1}{2}$ –5 mm.

Liberia, después recibí otros ejemplares de Bagaces.

Se aproxima al *C. latangulus* Rog. por la forma de la cabeza, el color y la punteadura; por la estructura del torax se parece más al *C. tripartitus* Mayr, pero difiere de ambos por la escama alta sutil y cortante.

106. C. STRIATUS Smith.

♀ major. *Pilosa, atra, capite antice, (cum antennis et mandibulis) late ferrugineo, coxis, articulationibus pedum tarassisque pallide testaceis, pilis erectis, albido sparsa, tibiis et scapis pilosis. Caput breve, convexum, occipite truncato, opacum, confertissime punctatum, mandibulis brevibus, subtilissime striatis et sparse punctatis, clypeo lateribus subparallelis, antice breviter producto, haud carinato, laminis frontalibus brevibus, valde sinuatis. Antennae breves, scapo angulos capitidis haud superante. Thorax sutura pro-mesonotali distincta, meso-metanotali fortius impressa, dorso depresso, lateribus obtusissime submarginato, angulo inter metanotii faciem basalem et declivem obtuso, rotundato, minus opacus quam caput et minus confertim grossius punctatus, punctis pronoti laterum et metanotii in rugas indistinctas confluentibus quae in metanoto subcirculariter concentrica dispositae sunt, suturis laevibus. Abdominis squama superne depressa, lata, lateribus distincte angulata, nitida; reliqua segmenta nitida, subtilissime, trasverse striolata.* Long. 4–5 mm.

♀ minor. *Capite magis elongato et antrorsum distincte angustato, minus convexo, atque multo subtilius et minus confertim punctato, nitidulo, omnino*