

antennis 12articulatis, articulo funiculi primo tribus sequentibus una majore, reliquis brevioribus quam crassioribus, clavae articulis duobus primis subaequalibus; thorace haud impresso, metanoto spinulis brevibus, seu dentibus acutis oblique erectis, pedunculi segmento 1. postice in-crassato, superne cum eminentia subconica, obtusa, 2. multo majore, subgloboso. Long. 2¹/₄ mm.

Hill City, S. Dakota: ein Exemplar von Herrn PERGANDE,

Diese Art bildet mit den zwei folgenden eine eigene Gruppe, welche unter den nordamerikanischen *Leptothorax* durch die 12gliedrigen Fühler und den nicht eingedrückten Rücken des Thorax ausgezeichnet ist. Von den zwei andern Arten der Gruppe unterscheidet sie sich durch die dunkle Farbe, die etwas stärkern Zähne des Metanotums, das breite 2. Stielchensegment und den an seinem Vorderrand stumpfwinklig vorgezogenen, mit 3 feinen aber scharfen Längskielen versehenen Clypeus.

***L. andrei n. sp.* (Taf. 8, Fig. 15).**

♀. *Testacea, abdomine postice obscuriore, pedibus pallidis, capite, thorace pedunculoque opacis, abdomine reliquo nitido; capite longitrosum punctato-ruguloso, genis clypeo que striatis, hoc et linea media frontis et verticis nitidulis, clypeo ipso medio debiliter carinato, antice subsinuato, mandibulis striatis; antennis 12articulatis, articulo funiculi primo sequentibus 3 una paulo breviore, clavae articulo 2. praecedente paulo majore; thorace confertim punctato, dorso haud impresso, dentibus metanoti crassis, pedunculi subtilius punctati segmento 1. antice longius petiolato, superne nodo subrotundato, 2. praecedente tertia parte circiter latiore, parum latiore quam longiore; pilis corporis parcis, brevibus, clavatis. Long. 2¹/₄ mm.*

Californien. Das einzige Exemplar wurde mir von Herrn ER. ANDRÉ freundlichst geschenkt.

Von der vorhergehenden Art durch die Farbe sowie durch die Form des Clypeus und des Stielchens, von der folgenden durch die Sculptur leicht zu unterscheiden. Die Behaarung ist äusserst spärlich, aber, wie es scheint, abgerieben. Besonders charakteristisch ist die Profilansicht des Stielchens.

***L. nitens n. sp.* (Taf. 8, Fig. 16).**

♀. *Testacea, pedibus dilutioribus, superne nitida, capite nitidissimo, vertice fere impunctato, genis et fronte rugulosis, clypeo antice striatulo, postice laevigato, haud carinato, margine antico subsinuato,*