

Pseudomyrma excavata Mayr, var. **flaviventris** n. var.

♂ Come tipo della specie, corrispondente alla maggioranza degli esemplari veduti del Mayr, considero quelle forme in cui l'addome è bruno o non più chiaro delle parti anteriori del corpo. Ne ho d'innanzi un esemplare originale.

Della nuova varietà Mayr ebbe un solo esemplare. Il dott. Festa la raccolse alla Punta di Savannah. In essa il capo e il torace sono neri, con le mandibole rossicce, i lati del pronoto tendenti più o meno al rosso rugginoso. Il primo segmento del peduncolo addominale è almeno in gran parte nero, i segmenti seguenti dell'addome giallo un poco rossiccio. Le antenne e le zampe sono testacee, con lo scapo alquanto imbrunito, le coscie bruno scuro.

Esemplari intermedi fra questa varietà e il tipo furono raccolti dal signor E. Simon nel Venezuela. In essi il metatorace è nero, spesso anche il capo e il primo segmento del peduncolo; il resto di un colore testaceo sporco, spesso con l'addome in parte bruniccio; le coscie bruno scuro.

Pseudomyrma flavidula F. Sm.?

La determinazione di questa specie è incerta, esistendo parecchie forme fra loro affinissime, e la descrizione di Smith essendo insufficiente a discriminarle. Posseggo esemplari identici dal Venezuela.

Leptothorax pungentinodis n. sp.

♀ *Testacea, capite, scutello, antennarum clava femoribusque medio fuscis, abdomine piceo, mandibulis, scapis, femorum basi, tibiis tarsisque pallidis. Capite mesonoto et scutello punctatis et regulariter striatis, quoad sculpturam caeterum L. spininodi similis. Antennis 11-articulatis, melanoto inermi, petiolo ut in L. spininodi spinulis dentibusque armato. Alae flavidae pterostigmate fusco.* L. 3 1/2 mm.

Un solo esemplare di Colon (Panama). È molto affine al *L. spininodis* Mayr, da cui si distingue però agevolmente pel capo striato e per la colorazione.

Azteca instabilis F. Sm.

Le numerose ♀♀ raccolte a Punta Savannah raggiungono dimensioni maggiori di quelle da me descritte di Costa Rica; le più grandi misurano 7 mm. La colorazione è un poco più chiara e la testa di forma più larga, coi lati più convessi. Però, a pari dimensione, gli esemplari di Darien sono, per forma, identici a quelli di Costa Rica; perciò ritengo che i più grandi individui che ebbi da quest'ultima provenienza non erano ♀♀ massime.

La ♀ (finora sconosciuta) è lunga 10-12 mm.; capo + torace 6,5; capo (con le mandibole) 2 × 1,6; larghezza del torace 2,6. Colore bruno castagno scuro, lati del capo tendenti al rosso ferrugineo, parte inferiore del torace più chiara del dorso, faccia ventrale dell'addome e