

courbe du mésonotum et s'unit sans limite à la face déclive; les épines sont fines, subparallèles, un peu recourbées en bas, plus courtes que la distance qui les sépare de la suture mésoménotale. Tout le corselet est luisant, lisse et marqué de points piligères comme la tête; les côtés du mésothorax et métathorax finement pointillés et demi-mats. Tout l'abdomen avec le pédicule est luisant. Le nœud du 1<sup>er</sup> segment du pédicule est trapézoïde, plus large devant, son bord antérieur arqué; le 2<sup>e</sup> nœud est étroit, subglobuleux. avec un faible sillon longitudinal médian. Pattes plutôt courtes. — Long. 2 1/4-2 1/2 mm.

Outre les exemplaires récoltés par M. Massart, je possède une ♀ également de Buitenzorg rapportée par M. le Prof. Solms et une ♀ de Sumatra. Je dédie l'espèce au savant directeur du Jardin botanique de Buitenzorg.

**Prenolepis simpliciuscula** n. sp.

♀. Inconnue.

♀. Brun marron, corselet plus ou moins rougeâtre, bouche, antennes et pattes fauves. Poils dressés obliques, nombreux, épais et obtus, bruns ou roussâtres, plus fins sur le scape et les pattes; pubescence couchée grisâtre, très fine. Tête un peu moins longue que large, mâte; yeux fort grands, occupant plus que le tiers des côtés, distants du bord postérieur bien moins que leur diamètre; antennes minces et médiocrement longues. Corselet assez luisant; le métanotum montre, sur le profil, une courbe sinueuse, la face basale formant avec la base de la face déclive un arc sans aucune trace d'angle; sauf un bord basal assez étroit, ce segment est lisse et luisant. Ailes enfumées. — Long. 3 1/3-4 mm.



*Prenolepis simpliciuscula* ♂. Armure génitale vue de côté. St. stipes; vo volsella; la lacinia; pi paramère interne.

♂. Testacé, yeux noirs, abdomen proprement dit rembruni. Des poils obliques, obtus, épais et peu nombreux sur tout le corps, sauf le métathorax, plus longs et plus nombreux vers l'extrémité de l'abdomen. Tête suborbiculaire, tronquée derrière; les yeux occupent environ la moitié des côtés et sont peu convexes, rapprochés du bord antérieur; le scapè dépasse l'occiput de 2/3 environ de sa longueur. Le corselet est allongé; à partir de la forte courbe de l'extrémité antérieure du mésonotum, le dos montre sur le profil, une courbe faible et continue, jusqu'au point où commence la face déclive du métanotum laquelle forme avec la face basale un angle obtus et arrondi. L'armure génitale se rattache au type de *P. vividula* Nyl. et espèces voisines, par la forme de la volselle et de la lacinie (valvules moyennes de Forel), tandis que le stipes est