

dépourvu d'appendice. Cette disposition est caractéristique et permet de distinguer aisément cette petite espèce de tous ses congénères. Ailes jaunâtres. — Long. 2 mm.

Pseudolasius minutus n. sp.

♀. Inconnue.

♀. Jaune testacé, membres plus pâles, mandibules rousses à bord brun, pubescence abondante, poils dressés, rares, presque nuls sur les membres; finement ponctuée, la tête mate, le reste plus ou moins luisant. Tête plus large que longue, rétrécie devant les yeux qui sont gros, bombés, occupant environ le tiers des côtés; la fossette antennaire n'est pas séparée de la fossette clypéale; les mandibules sont armées de 7 dents inégales, l'apicale fort longue; le scape dépasse l'occiput un peu plus que la longueur du 1^{er} article du funicule: les articles moyens de celui-ci sont à peine plus longs qu'épais; corselet de forme ordinaire; le métanotum offre, sur le profil, une courbe sans trace d'angle. Écaille petite, cunéiforme, à bord supérieur droit. — Long. 5 1/3 mm.

♂. Jaune, membres pâles, tête un peu brunâtre; luisant, pubescence couchée plutôt longue et médiocrement abondante; l'abdomen a de nombreux poils dressés qui sont fort rares sur le reste du corps; à peine ça et là quelques poils sur le scape et les tibias. La tête est à peu près comme chez *P. familiaris*, avec les yeux fort proéminents et des ocelles énormes couronnant une forte saillie du vertex; les mandibules sont obliquement tronquées, pointues et tranchantes; le scape, placé obliquement sur le contour postérieur de l'œil, dépasse celui-ci d'un peu moins que la moitié de sa longueur; les articles moyens du flagellum sont un peu plus longs qu'épais, les derniers bien plus allongés. Le corselet est haut et bombé par devant, descendant en courbe continue, jusqu'à la limite du pédicule. L'écaille est épaisse, cunéiforme, à bord supérieur droit. Ailes jaunâtres, à nervures testacées. — Long. 2 2/3 mm.

Une ♀ et plusieurs ♂♂. Distinct de ses congénères, par sa petite taille.

Je fais suivre la description de deux fourmis nouvelles, également de Java, récoltées par M. H. Fruhstorfer.

Leptogenys diminuta F. Sm., subsp. **Fruhstorferi** n. subsp.

♀. Extrêmement voisine de *L. diminuta* dont cette forme est le représentant javanais. Plus petite, la tête plus étroite par rapport au corselet, à côtés plus parallèles. Mandibules finement striées, mates; épistome strié; tête mate, couverte de stries longitudinales dans sa partie antérieure, formant des arcs concentriques en