

arrière. Corselet luisant en dessus, le pronotum avec des rides longitudinales irrégulières; côtés irrégulièrement ridés. Écaille du pédicule plus étroite que chez *diminuta*, notablement plus haute que longue (plus longue que sa hauteur chez *diminuta* et ses variétés). Ventre lisse et luisant. — Long. 6-6 1/2 mm.

Mont Tengger, Java oriental; 1200 mètres d'altitude.

**Polyrhachis Arachne** n. sp.

♂. Noir mat, abdomen proprement dit luisant; pas de poils dressés, sauf sur le devant de la tête et l'extrémité de l'abdomen. Tête suborbiculaire, avec les yeux placés fort en arrière, couverte d'une ponctuation assez fine, un peu confluyente et semée de points un peu plus forts donnant naissance à de tout petits poils couchés. Épistome muni d'un lobe tronqué ou faiblement échancré, dilaté de chaque côté en forme de dent; scape pas sensiblement comprimé. Le corselet a une ponctuation fondamentale comme celle de la tête, mais à la place des points piligères, il est creusé de fossettes larges, un peu confluentes, dont les interstices, forment réseau; ces fossettes manquent sur les côtés du mésothorax et du métathorax, ainsi que sur la face descendante de ce dernier; l'extrémité des épines est lisse et luisante. Dos du corselet convexe, non bordé, pronotum armé de deux épines droites, longues, aiguës; épines du métanotum fort longues, obliques, très peu divergentes à la base, recourbées au bout en corne de chamois. Le pédicule est ponctué comme la face descendante du métanotum; l'écaille est fort haute, vue de côté, elle est plus haute que longue; elle porte deux épines faiblement courbées, formant entre elles un angle de 120 degrés environ, lorsqu'on les regarde dans le sens où elles paraissent droites; entre les épines, le bord supérieur de l'écaille forme en avant une saillie mousse. L'abdomen proprement dit est luisant, finement réticulé, avec de petits points épars portant de tout petits poils couchés. — Long. 6-7 mm.

♀. Le pronotum n'a, à la place des épines, que des tubercules mousses; les épines du métanotum sont plus courtes que chez la ♀, à peu près aussi longues que leur base est éloignée de la suture méso-métanotale; elles sont mousses et faiblement courbées, nullement en corne de chamois; celles de l'écaille sont bien plus divergentes que chez la ♀. Sculpture comme chez la ♀, sauf le scutum du mésothorax qui est luisant, plus faiblement ponctué que le reste et avec des fossettes rudimentaires. — Long. 8 1/2-9 mm.

Palabuan, Java méridional. Se rapproche de *P. simplex*, *rupicapra* etc. mais bien distinct par sa sculpture et la forme des épines. Le nid attaché à des feuilles de palmier est formé d'une seule chambre ovale de 6 × 4 cm. C'est un nid de soie ayant la consistance d'une forte toile d'araignée, renforcé de débris de feuilles.