

## FORMICIDARUM SPECIES NOVÆ VEL MINUS COGNITÆ

IN COLLECTIONE MUSÆI NATIONALIS HUNGARICI,  
QUAS IN NOVA-GUINEA, COLONIA GERMANICA, COLLEGIT L. BIRÓ.

A CAROLO EMERY,

1900 b

in Archigymnasio Bononiensi zoologiae lectore publico descriptæ.

## Publicatio secunda:

(Tab. VIII.)

## IV.

*Species novæ e subfamiliiis Dorylinarum et Poncerinarum; specierum generis Trapeziopeltae atque generis Ponerae s. str. ex Oceania tabulæ analyticæ.*

47. *Aenictus currax* n. sp. (Tab. VIII. fig. 1.)

*Operaria.* Fusco-nigra, nitida, pilosa, macula magna lutea utrinque ad angulos occipitis, ore, antennis, prothorace, epinoto, petioloque castaneis, geniculis, tibiis tarsisque rufescentibus. Caput oblongum, postice truncatum seu late emarginatum, scapo marginem occipitis haud attingente, funiculi articulis omnibus longioribus quam crassioribus. Caput et thorax levia, nitidissima, punctis minutis, piligeris dispersis; pleuræ striato-rugosæ, opacæ; epinotum superne minutissime punctulatum sed nitidum, basi breviter striatum, dorso mesonoti epinotique inter se loco suturæ angulum obtusum amplectentibus, epinoto ipso postice rotundato. Petiolus et postpetiolus nitidi, hic illo vix latior et paulo brevior, nodo petioli elongato-ovato, nodo postpetioli subrotundo, vix longiore quam latiore, petiolo subtus antice cum lobo obtuso, postpetiolo cum denticulo acuto. — L. 3— $3\frac{1}{4}$  mm.

*Ae. levicincti* F. Sm. et *gracili* EMERY affinis; a priore capite lateribus minus rotundato, postice latius truncato, maculisque luteis capitis repositis, ab altero postpetiolo minus gracili et haud angustiore quam petiolus, ab utroque antennarum scapo breviore et epinoto petioloque superne nitidis agnoscendus.

\* Vide publicationem primam: Természetrajzi Füz. XX. 1897, p. 571—599.