

striatis, pagina declivi abrupta, subplana, angulis posticis nequaquam dentiformibus. Petioli squama crassior, haud punctata. Abdominis segmentum secundum punctis multo subtilioribus quam in *R. cibrata*, sed crebrioribus et in lateribus magis minusve longitrorsum confluentibus, segmento tertio subtilius punctato. Pedes breviores quam in *R. cibrata*. — L. $1\frac{3}{4}$ mm.

Foemina. Paulo rudius sculpta quam operaria, epinoto superne rugoso, petiolo latiore, segmento postpetiolari scabriore, opaco. Alæ desunt. Oculi majusculi et ocelli adsunt. Color obscurior. — L. parum ultra 2 mm.

Insula Seleo prope *Berlinhafen* quatuor ♀♀. Ad *Paumomu River* ♀ legit. L. LORIA (coll. Musæi Januensis).

50. *Rhytidoponera aenescens* n. sp.

Operaria. *Rh. impressac* MAYR var. *purpureac* EMERY proxima, notis sequentibus agnoscenda: caput angulis posticis magis rotundatis, rugis capitidis magis reticulatis, minus longitudinalibus; thorax robustior, mesonoto minus convexo, postice super epinotum aliquantulum elevato, linea dorsi propterea post mesonotum abrupte depressa, epinoto irregulariter minus transverse, magis reticulatim rugoso; petiolus nodo breviore, superne haud deplanato, sed a latere viso supra, antice cum angulo distincto, postice rotundato; postpetiolus concentrica, rufius striatus; segmentum tertium striis longitudinalibus mediis antrorsum convergentibus; coxae antice rugosæ; pili erecti breviores et crassiores. Color fuscus, vel fusco-ferrugineus, subænescens, segmentis abdominalis 2—3 cinereo-ænescentibus, mandibulis, antennis et pedibus magis minusve rufescentibus. — L. 7— $7\frac{1}{2}$ mm.

Lemien, apud *Berlinhafen*.

51. *Rhytidoponera inops* n. sp.

Operaria. Fusca, subænescens, mandibulis, antennis pedibusque ferrugineo-rufescentibus, ano flavo-testaceo. Caput ut in *R. metallica*, scultura tamen magis longitudinali, fronte regulariter longitrorsum sulcata. Thoracis structura ut in *R. metallica*, rugæ pronoti longitudinales, antice et lateribus reticulatim confluentes, mesonoti reticulatæ, epinoti superne transversæ, laterum irregulares. Impressio epinoti pro nodo petioli magna, rotundata. Nodus petioli latior quam in *R. metallica*, subglobosus, a latere visus superne et postice valde rotundatus, irregulariter rugosus. Segmentum postpetiolare divergenter longitrorsum striatum; segmentum sequens medio subleve, lateribus oblique subtilissime striatum. — L. 5 mm.

Specimen unicum.