

Trapeziopelta MAYR.

Species hujus generis hucusque notæ (♀ et ♂) tabulæ sequentis ope
discriminandæ sunt:

1. Species majores; antennæ sine clava distincta	— — — — —	2
Species minores; antennæ clava quadri-articulata	— — — —	5
2. Anguli capitis postici haud rotundati.	— — — (Celebes)	<i>T. maligna</i> F. SM. cum varietate nova ex Mentawai.
Anguli capitis rotundati	— — — — —	3
3. Funiculus articulis omnibus longioribus quam crassioribus.		
Funiculus articulis mediis crassioribus quam longioribus	— — —	4
4. Mandibulæ haud dilatatae	— — — —	(Papuasia) <i>T. latinoda</i> EMERY.
Mandibulæ usque ad dimidiam longitudinem sensim dilatatae, deinde apicem versus angustatae	— — —	(Sumatra) <i>T. Modiglianii</i> n. sp.
5. Processus clypei apice emarginatus	— —	(Sumatra) <i>T. bidens</i> n. sp.
Processus clypei angustus, haud emarginatus; species minutiores	6	
6. Processus clypei longus et tenuis plus duplo longior quam latior.		
Processus clypei brevior	— — — —	(Papuasia) <i>T. xiphias</i> n. sp.
(Papuasia) <i>T. tenuis</i> n. sp.		

Adnot. — Eadem generi videtur pertinere *Ponera nitida* F. SM. ex Celebes,
in coll. Musei britannici * generi *Brauloponeræ* irrite adscripta.

52. *Trapeziopelta xiphias* n. sp. (Tab. VIII. fig. 2.)

Foemina. Castanea, mandibulis, scapo pedibusque rufo-testaceis,
nitida, dispersissime subtiliter punctata, longe pilosa. Caput longius quam
latius, subrectangulare, antice vix latius quam postice, hic late arcuatim
emarginatum, clypeo brevi, medio elevato et in processum linearem triplo
longiorem quam latiorem producto. Mandibulæ lineares, ultra medium
dente acuto, apice bidentatae. Antennæ scapo marginem occipitalem attin-
gente, articulis 3—8 (funiculi 2—7) brevibus, transversis, quatuor ultimis
clavam efficientibus. Thorax angustus, sua latitudine fere triplo longior,
epinoto obtuse truncato. Petiolus rotundato-subcubicus; segmentum post-
petiolare latius quam longius, segmento sequente brevius, ab eo strictura
forti separatum. Alæ desunt. — L. 4 mm.

Friedrich-Wilhelmshafen; specimen unicum.

53. *Trapeziopelta tenuis* n. sp. (Tab. VIII. fig. 3.)

Foemina. Obscure fusca, mandibulis, antennis, pedibusanoque rufo-
testaceis. Præcedenti simillima, sed minor, processu clypei minus longo et
tenui, antennarum scapo breviore, marginem occipitalem haud attingente,
funiculi articulis mediis brevioribus, mandibularum dente marginali a basi

* Conf. MAYR in: Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 36. p. 362.