

postice vix crenulato. Antennæ scapo reclinato marginem occipitis haud attingente, funiculi crassi, articulis omnibus excepto 1° et ultimo transversis, scilicet 2—6 brevissimis, 7 majore, una cum 4 ultimis magnis clavam 5 articulatam efficientibus. Thorax dorso subrecto, sutura pro-mesonalni distincta, meso-epinotali obsoleta, epinoti pagina declivi nitida, abrupta, concava, lateribus acute marginata, angulo inter ipsam et basalem rotundato, mesonoto et epinoto paulo angustioribus quam pronotum. Petioli squama a latere visa antice posticeque subrecta, superne oblique truncata, retrorsum declivis, a dorso visa semicircularis vel semilunaris, i. e. antice convexa, postice subconcaava. Segmentum postpetiolare antice truncatum. — L. 2 mm.

Præcedenti affinis, sed minor, magis opaca, et petioli structura diversa agnoscenda.

Friedrich-Wilhelmshafen.

59. *Ponera Birói* n. sp. (Tab. VIII. fig. 9.)

Operaria. Fusco-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufis; opaca, creberrime punctata; squamæ petiolaris margine, segmentis abdominis posterioribus pedibusque subnitidis, mandibulis, epinoti pagina declivi, petioli pagina posteriore et superficie segmenti postpetiolaris antica levibus, nitidis; pubescens atque nisi in gastere sine pilis erectis. Caput paulo longius quam latius, postice late arcuatim emarginatum, lateribus arcuatis, antrorum convergentibus, oculis minutis ad $\frac{1}{5}$ longitudinis laterum capitidis sitis, clypeo brevi, margine antico medio late arcuato, mandibulis disperse punctatis, elongatis, margine lateralí sinuato, masticatorio dentibus 6—7 majoribus, posterioribus obtusis. Antennæ scapo marginem occipitis fere attingente, articulis funiculi excepto primo et ultimo distincte crassioribus quam longioribus. Thorax dorso subrecto, pronoto rotundato, mesonoto epinotoque sensim angustioribus, sutura meso-epinotali obsoleta, epinoti pagina declivi lateribus marginata, in basalem arcuatim transeunte. Petioli squama ovata, crassiuscula, a latere visa antice posticeque subrecta, superne vix attenuata; segmentum postpetiolare antice truncatum et planum, strictura inter hoc et sequens distincta. — L. $3\frac{1}{8}$ — $3\frac{2}{8}$ mm.

Foemina. Differt ab operaria notis solitis; alæ ignotæ. — L. $3\frac{1}{2}$ —4 mm.

P. Perkinsi For. proxima, sed occipite distinctius arcuatim emarginato, antennarum scapo breviore, funiculo apice paulo crassiore, epinoto magis compresso et sutura meso-epinotali obsoleta agnoscenda.*

* *P. Andréi* n. sp. ♂ (Tab. VIII. fig. 47.) *P. Perkinsi* simillima, fusco-nigra, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufescensibus. Sculptura et pubescens, ut in illa specie. Caput postice profundius arcuatim emarginatum, oculis ad $\frac{1}{6}$ partem