

margine ciliato, linea frontali subtili usque ad verticem producta. Antennarum scapus marginem occipitis vix attingit, funiculi apicem versus incrassati articuli 2—4 crassiores quam longiores, penultimi tam longi quam crassi. Thorax validiusculus, pronoto et mesonoto una ovatis et convexis, sutura pro-mesonotali distinctissima, dorso in sutura meso-epinotali angulatim impresso, epinoti parte basali antice angustiore quam postice, basi longitrorum convexa in declivem curvatim transeunte, hac transversim concava, utrinque marginata. Petiolus squama ovata, alta, antice postice longitrorum subrecta, antice transversim convessa superne sensim attenuata, crassitie sua ad basin plus quam dimidio altiore : strictura inter segmenta 2—3 vix distincta. — L. $2\frac{3}{4}$ —3 mm.

Insula Tamara et Lemien.

62. *Ponera Mocsáryi* n. sp. (Tab. VIII. fig. 15—16.)

Operaria. Praecedenti simillima sed minor, capite angustiore, minus confertim punctata et parcus pubescens, vix pruinosa, oculis minoribus, stemmatibus 8—10 compositis, clypei carina antice obtusa, tamen marginem anticum medio subangulatim productum fere attingente, antennis minus crassis, thorace paulo graciliore, squama petioli minus crassa, superne magis attenuata. Ceterum *P. pruinosa* similis. — L. $2\frac{2}{3}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

P. pruinosa et *Mocsáryi* sunt *P. truncatae* F. Sm. affines, sed statura multo minore aliisque notis diversae.

Insula Tamara et Lemien : 3 specimina.

63. *Ponera pallidula* n. sp. (Tab. VIII. fig. 17—18.)

Operaria. Flavo-testacea, capite saepe fuscescente, mandibulis, antennis et pedibus flavis, capite superne opaco, thorace abdomineque nitidis, pubescens, pilis fere destituta. Caput latitudine sua maxima circiter quarta parte longius, antrorum aliquantulum angustius, postice truncatum, medio vix arcuatim emarginatum, superne confertissime punctatum, oculis minutis versus $\frac{1}{5}$ partem antican longitudinis, mandibulis elongatis, denticulatis, apice dentibus tribus majoribus, clypeo medio obtuse carinato, antice leviter bisinuato; laminarum frontalium disco deplanato, margine ciliato, sulco frontali subtili usque ad dimidiad capitum longitudinem producto. Antennæ scapo marginem occipitis non attingente, articulo 2 sequentibus una æquilongo, his brevissimis, 4 penultimis parum crassioribus quam longioribus cum ultimo clavam efficientibus. Thorax suturis distinctis, dorso tamen haud impresso, pronoto mesonotoque superne simul ovalibus, epinoto superne illis angustiore, lateribus parallelis, pagina basali et declivi subæquilongis, inter se angulum obtusum atque rotundatum complectentibus, declivi pro receptione squamæ leviter concava. Petiolus squama subcirculari, latiore quam epinoti pars declivis, alta, haud crassa, superne