

superne nodo parvo cuneiformi; postpetiolus paulo latior, transverse subtrapezoideus. Gaster antice dense punctulata, subopaca. — L. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

Operaria. Flavo-testacea, capite thoraceque creberrime reticulato-punctatis, opacis, abdomine nitido. Caput tam longum quam latum, lateribus convexis, occipite late emarginato, superne rugis nonnullis longitudinalibus vix conspicuis, clypeo convexo, antice arcuato, laminis frontalibus brevibus, mandibulis trigonis, acute denticulatis, scapo marginem occipitis attingente. Thorax promesonoto convexo, utrinque rotundato et obtusissime angulato, mesonoto postice utrinque obtuse angulato, dorso post mesonotum abrupte descendente, epinoti spinis acutis, pagina declivi ipsius brevioribus. Petiolus nodo angusto, minuto, subcuneiformi; postpetiolus transverse ovalis petiolo circiter dimidio latior; gaster nitidissima. — L. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fœmina. Caput brevius quam in milite, sed similiter constructum et sculptum. Thorax nitidus, mesonoto longitrosum striato, scutello nitido, epinoti lateribus rugosis. Petiolus latior, postpetoli anguli anteriores prominentes. — L. 3 mm.

Insulae Beliao et Seleo. Nidus in ligno putrescenti.

72. *Pheidole laminata* n. sp. (Tab. VIII. fig. 28—29.)

Miles. Facie, structura thoracis et petioli sculpturaque *Ph. cryptocerae* proximus; flavo-testaceus, clypei et mandibularum margine fusco, abdomine pedibusque dilutiotibus. Caput paulo magis elongatum, lobis occipitis magis rotundatis, incisura minus lata et minus profunda separatis; mandibulæ minus convexæ, striatulæ, oculi paulo post $\frac{1}{4}$ longitudini capitidis; laminæ frontales antice in laminam angulatam productæ, parum ultra oculum extensæ, scrobe brevissima postice evanescente, impressione pro scapo superficiali, rugis in ipsa debilioribus, sed non omnino evanescentibus; sculptura capitidis paulo subtilior quam in *Ph. cryptocera*. Petiolus, postpetiolus et basis gasteris subopaca, microscopice scabra. — L. $2\frac{1}{4}$ mm.

Operaria. *Ph. cryptocerae* simillima, gracilior et pallidior atque petioli, postpetioli et gasteris basi subopacis agnoscenda. — L. $1\frac{1}{3}$ mm.

Militis specimen unicum cum operariis nonnullis.

73. *Pheidole fuscula* n. sp.

Miles. Fusco-niger, nitidus, mandibulis, genis, antennis pedibusque pallidis, scapo femoribusque fuscatis, mandibulis genisque nonnunquam rufis. Caput paulo longius quam latius, lateribus late arcuatum, occipite angulatim inciso, angulis posticis rotundatis, superne striatum, striis antic confertioribus, postice sensim minus crebris; deinde evanescentibus, occipite extremo lateribusque nitidissimis, punctatis; occiput et vertex cum sulco medio profundo et impressione verticis transversa superficiali, utrin-