

que impressione altera sublevi pro apice scapi; clypeus levis, sine carina; mandibulae convexae, leves, disperse punctatae; laminæ frontales non ultra oculum prolongatae, haud elevatae. Antennæ breves, scapo vix dimidium spatii inter oculum et marginem extreum lobi occipitalis attingente, articulis funiculi mediis crassioribus quam longioribus, clava crassiuscula. Thorax pronoto lato, utrinque rotundato, proeminente mesonotoque levibus, nitidisque, hoc convexo, utrinque cum impressione longitudinali, epinoto superne concavo, utrinque carina marginali quæ in dentem seu spinulam acutam desinit. Petiolus nodo subcuneiformi, parte antica segmenti haud latiore, superne rotundato; postpetiolus paulo latior, transverse ovalis. Petiolus, postpetiolus et gaster leves et nitidi. — L. 2— $2\frac{1}{4}$ mm.

Operaria. Color militis; nitidissima, genis circum foveam antennalem striatis, mesopleuris superne punctatis, cæterum levissima, punctis piligeris minutissimis. Caput postice truncatum, angulis posticis lateribusque rotundatis, mandibulis apice bidentatis, cæterum edentulis, levibus, clypeo convexo, antennarum scapo occipitis marginem attingente, funiculo ut in 4. Thorax promesonoto convexo, epinoti pagina basali et declivi subæquilongis, illa deplanata, postice dentibus acutis armata. Petiolus ut in 4; postpetiolus petiolo haud latior, subglobosus. — L. $1\frac{1}{8}$ mm.

Insula Beliao; nidos in trunko putrescente.

74. *Monomorium fossulatum sechellense* EMERY, var. *papuasiæ* n. var.

Operaria. Subsp. *sechellensi* simillima, capite paulo breviore, clypei sub laminas frontales eminentia magis conspicua, epinoto utrinque haud distincte dentato, sed saltem angulato, nodoque petioli postpetiolo paulo latiore (*in sechellensi* paulo angustiore) agnoscenda. Sculptura ut in subsp. *sechellensi*.

Lemien, Montes Hansemanni.

75. *Pheidolegeton affinis* JERD., var. *minor* n. var.

Operariae majoris seu *militis* specimen maximum ocello præditum est multo minor (L. 10 mm., caput cum mandibulis $4 \times 3\frac{1}{8}$ mm.) speciminiibus ocelliferis hujus speciei quæ ex India et Australia vidi. Vertex levior, punctis paucis et rugis obsoletis; cæterum typo similis. — *Operaria minor* a typo haud agnoscenda.

Ex insula Tamara.

Adnot. — Eidem varietati adscribendas censeo fœminas quas ex Insulis Aru olim acceperam, a ♀ *Ph. affinis* typici similiter statura minore (L. 14—15 mm., caput $3\frac{1}{3} \times 3$, ala ant. 11 mm.) et capite minus scabro distinguendas.

Typus speciei in insulis Papuasiae adjacentibus occurrit; ♀ ex Batjan a Dom. STAUDINGER & BANG HAAS emsi.