

nodo rotundato, longiore quam latiore; postpetiolus illo subæquilatus sed brevior, subglobosus. — L. 1— $1\frac{1}{4}$  mm.

*Insula Beliao.*

77. *Pheidologeton (Aneleus) similis* MAYR \* var. *crassiuscula* n. var.

*Operaria.* A typo speciei ex Insulis Nicobar differt solummodo thorace breviore et latiore.

*Friedrich-Wilhelmshafen.* Miles ignoratur.

78. *Oligomyrmex atomus* n. sp. (Tab. VIII. fig. 30.)

*Miles.* Ferrugineus, capite obscuriore, mandibulis, antennis, pedibus petioloque flavescentibus, vel flavescens, capite ferrugineo, nitidus, capite opaco, copiose albido-pubescentibus et parce, longe pilosus. Caput elongatum, circiter  $\frac{1}{3}$  longius quam latius, lateribus parallelis, angulis posticis rotundatis, occipite utrinque dente erecto, acuto, inter dentes profunde arcuatim emarginato; clypeus brevis, abrupte declivis, inermis, medio impressus, postice inter laminas frontales breves divergentes productus, area frontali nulla; mandibulæ convexæ, nitidæ, levissimæ, obtuse 4—5 denticulatæ; genæ et frons longitrosum striato-rugosæ, caput cæterum confertissime rugose punctatum, punctis in lateribus occipitis magis confluentibus; oculi minimi ad  $\frac{1}{4}$  capitis laterum. Antennæ breves, scapi reclinati apice dimidiadim capitis longitudinem paulo superante, articulo 2. sequentibus tribus una majore, 3—7. brevioribus quam crassioribus. Thorax pronoto magno, subgloboso, nitido, mesonoto brevi, sutura pro-mesonotali distincta, meso-epinotali profunde impressa, epinoto subcubico, utrinque marginato, postice dentibus acutis, confertissime punctato, opaco. Petiolus nodo superne viso rotundato; postpetiolus nodo petioli vix latior et parum brevior, transverse ovalis. — L.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$  mm.

*Operaria.* Color, pubes et pili ut in 4. Caput, thorax et petiolus confertissime punctata, opaca. Caput longitudine sua fere æquilatum, angulis posticis rotundatis, occipite inermi, late, hand profunde emarginato, punctis in toto capite æqualiter confertis, haud confluentibus; mandibulæ minus convexæ quam in 4, acutissime 5 dentatæ; oculi minimi ad  $\frac{2}{5}$  longitudinis capitis. Antennarum scapus reclinatus  $\frac{3}{4}$  longitudinis capitis attingens. Thorax promesonoto tam lato quam longo, antice arcuato, angulis humeralibus obtusis, postice angustato, sutura pro-mesonotali nulla, meso-epinotali impressa; epinotum ut in 4, utrinque marginatum et dentigerum. Petiolus punctatus, nodo subrotundo; postpetiolus nitidus, nodo petioli subæquali. — L.  $\frac{4}{5}$  mm. vel parum ultra.

\* *Solenopsis similis* MAYR, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 12. 1862. p. 751. — In specimine typico a Dom. MAYR benigne communicato et in varietate papuana antennæ sunt 11 articulatae. Species propterea a genere *Solenopsi* excludenda.