

Montes Hansemanni, Insula Tamara et Beliao; ex trunco putre-scente et etiam cibri opere collecta.

Operaria hujus speciei inter omnes formicas hucusque notas minima.

79. Oligomyrmex subreptor n. sp.

Operaria. Flava, nitida, pube longa oblique abstante copiose vestita et pilis longioribus nonnullis. Caput oblongum, quarta parte circiter longius quam latius, lateribus subparallelis, margine postico leviter concavo; clypeo inermi, sed lobo lato, medio truncato et subemarginato, utrinque obtuse angulato instructo, laminis frontalibus brevibus, oculis perminutis, punctiformibus, nigris. Mandibulæ trigonæ, margine masticatorio acute 5 dentato. Antennarum scapus $\frac{3}{4}$ longitudinis capitidis vix attingit, articuli 3—7 transversi, ultimus praecedente plus quam triplo longior. Thorax sutura meso-epinotali impressa, epinoto utrinque margine ad limitem inter partem basalem et declivem obtuse angulato. Petiolus nodo superne rotundato; postpetiolus nodo petioli vix latior, sed brevior, transverse ovatus. — L. paulo ultra $1\frac{1}{5}$ mm.

Miles ignoratur.

80. Solenopsis maxillosa n. sp. (Tab. VIII. fig. 31—32.)

Operaria. Fusco-picea, nitidissima, petiolo et postpetiolo rufescensibus, mandibulis, antennis, pedibus et abdominis apice pallide ochraceis, punctis dispersis pubem haud copiosam erectam et pilos paucos longiores gerentibus obsita. Caput oblongum, lateribus subrectis, parallelis, postice vix emarginatum; clypeus bicarinatus et dentibus binis acutis, longis, sub-spiniformibus, armatus, et utrinque denticulo altero minutissimo obtuso, marginibus antero-lateralibus late arcuatim emarginatus; oculi minutti, depresso; mandibulæ angustæ, sublineares, margine masticatorio a margine basali haud separato, dentibus quatuor acutis, fuscis, quorum primus paulo ultra dimidiā longitudinem mandibulæ, tres ultimi inter se proximiores. Antennarum scapus marginem occipitis haud attingit, articuli 3—8 crassiores quam longiores. Thorax sutura meso-epinotali profunde impressa, epinoto brevi, rotundo, duplo breviore quam promesonotum. Petiolus antice tenuis, postice nodo alto, superne rotundato, paulo latiore quam longiore, antice subtus dente minuto; postpetiolus subglobosus petiolo paulo latior et minus altus. — L. $1\frac{2}{3}$ mm.

Foemina. Picea, abdomen dilutiore, mandibulis, antennis et pedibus pallide ochraceis, longius copiosiusque pilosa quam operaria. Caput latius quam longius, oculis et ocellis magnis; clypeus dentibus magnis, crassioribus, haud spiniformibus et utrinque dente altero minuto, acuto. Mandibulæ ut in ♀, sed dentibus majoribus. Antennæ 11 articulatæ, scapo ocellum parem vix attingente, articulis 3—9 paulo crassioribus quam longioribus. — L. $4\frac{1}{4}$ mm.