

84. Crematogaster Birói n. sp. (Tab. VIII. fig. 39—41.)

Operaria. Flava, capite (exceptis mandibulis et antennis) gastereque nigris, nitidissima, vix pubescens et parce longe pilosa, scapo tibiisque etiam pilosis. Caput postice rotundatum, clypei parte media parum elevata, basi longitrorsum rugulosa, utrinque a carina subtili limitata, carinula altera ante antennarum articulationem, laminis frontalibus brevibus, genis breviter striatis, mandibulis angustis 5 dentatis, disperse punctatis. Antennæ 11 articulatæ, longæ et tenues, articulis funiculi mediis vix crassioribus quam longioribus, clava elongata, biarticulata. Thorax sutura pro-mesonotali superne nulla, meso-epinotali haud profunde impressa, promesonoto antice rotundato, superne subdepresso, setis paucis longis ex tuberculis minutis surgentibus quarum una longissima locum anguli humeralis obsoleti signat; epinotum pagina basali a declivi haud distincta; oblique retrorsum descendens, transversim concavum, utrinque spina longa, tenui, acutissima, spinis basi longe distantibus. Petiolus superne depresso, elongatus, ovalis, antice angustatus et subpedunculatus, a latere visus cuneiformis, postice altior quam antice; postpetiolus subglobosus, sine impressione longitudinali, vel tantum postice obsolete impressus. Pedes graciles. L. 2— $2\frac{1}{3}$ mm.

85. Crematogaster flavitarsis n. sp. (Tab. VIII. fig. 42.)

Operaria. Obscure fusca, mandibulis et articulationibus rufescentibus, tarsis flavis; breviter copiose pilosa; caput et thorax confertim subtiliter punctata, subnitida, occipite, promesonoti parte media et epinoto postice levioribus, nitidis, abdомine nitido, thoracis lateribus minus subtiliter punctatis, opacis. Caput latius quam longius, lateribus arcuatiss., margine postico recto, angulis rotundatis, clypei lateribus genisque striatis, mandibulis basi striatis. Antennæ 11 articulatae, scapo marginem occipitis vix attingente, articulis funiculi mediis non crassioribus quam longioribus, clavæ triarticulatae articulo basali sequente multo breviore, præcedente fere sesqui longiore. Thorax superne concavus et marginatus, sutura pro-mesonotali nulla, meso-epinotali impressa, pronoti angulo humerali in spinam trigonam acutam producto, angulo mesonoti postico subdentiformi, epinoto postice arcuatim descendente, transverse late concavo, spinis subtilioribus quam pronoti et acutissimis. Petiolus fere duplo latior quam longior, antice dilatatus, angulis anticis rotundatis, superne depresso; postpetiolus bre-

rude striato, epinoti spinis curvatim deflexis. Petiolus brevius ovalis quam in *C. polita*, sed antice distinctius pedunculatus; postpetiolus striatus, postice impressus et superne depresso, sed non proprie sulcatus. Gaster modice nitens inter puncta piligera subtilissime reticulata. — L. 4 mm.

Duo specimina in coll. EMERY.