

vorkommen, und von den meisten nur die Arbeiterinnen bekannt sind, während die ♀ in manchen Fällen gerade die auffallendsten Merkmale aufweisen. *T. striativentre*, *meridionale* und *exasperatum* habe ich, da sie scharf abgegrenzte Formen sind, als besondere Arten aufgefaßt.

Für die übrigen mag folgende Tabelle gelten:

Schlüssel zur Bestimmung der ♀ mit Rücksicht auf die ♀, wenn solche bekannt sind.

1. Epinotum durchaus ohne Zähne; Kopf und Pronotum größtenteils glatt und glänzend subsp. *inermis*.
Epinotum mit deutlichen Zähnen oder Dornen. — 2.
2. Petiolus der ♀ nicht viel schmaler als der Postpetiolus, dieser besonders kurz. Petiolus und Postpetiolus der ♀ sehr breit, in der Mitte ihres dorsalen Randes eingedrückt.
Kopf ganz gestreift subsp. *ferox*.
Seiten des Kopfes hinter den Augen ziemlich glatt und stark glänzend var. *diomedaea*.
Petiolus der ♀ bedeutend schmaler als der Postpetiolus. Petiolus und Postpetiolus der ♀ von gewöhnlicher Form. — 3.
3. Kopf meistens nicht oder wenig glänzend, grob gestreift oder auch feiner gestreift und fast glanzlos; in den grob gestreiften Formen von einer Stirnleiste zur anderen in der Höhe ihres Hinterendes 14—16 erhabene Längsrünzeln; wenn die Zahl größer ist, so sind dieselben mehr oder weniger ungleich stark und dadurch vermehrt, daß zwischen den Hauptrünzeln andere schwächere entstanden sind.
Typische Form. Streifen am Kopf in größerer Zahl und ungleich, Grundpunktierung dazwischen undeutlich oder schwach, Petiolus und Postpetiolus oben in der Mitte geglättet; Farbe dunkel, selten hellbraun mit dunklem Kopf und Gaster *caespitum* i. sp.
Groß und stark skulpturiert, Petiolus und Postpetiolus scharf und grob längsgestreift var. *fortis*.
Wie die vorige, Gaster mehr oder weniger deutlich an der Basis gestreift var. *hispanica*.
♀ ebenso klein wie *semileve*, Kopf fast glanzlos, Skulptur ungefähr wie der Typus. ♀ klein, mit größtenteils gestreiftem Mesonotum var. *debilis*.
Rotgelb, Kopf mit weniger starker Längsstreifung, Grundskulptur dazwischen stark, Gaster an der Basis fein gestreift, Stielchenglieder unregelmäßig gerunzelt, in der Mitte nicht geglättet var. *syriaca*.