

Petiolusknoten höher als bei der ♀, fast schuppenartig, mit in der Mitte eingekerbtem Dorsalrand.

♂ (nur von der typischen Form bekannt). Schwarz, Hinterleib hinten braun, Gliedmaßen braungelb; abstehend behaart. Kopf, Thorax größtenteils und Stielchen dicht skulpturiert und matt; Scutum des Mesonotum z. T. glänzend, hinten in der Mitte fein gestreift; Scutellum gestreift in der Mitte glatt. Kopf hinter dem Auge gradlinig verschmälert, der Hinterrand etwa um die Hälfte so lang, wie die größte Breite des Kopfes. Epinotum mit zahnartigem Winkel. Petiolus und Postpetiolus nicht hoch, letzterer beiderseits vorn scharf winklig. Flügel farblos mit sehr hellem Geäder. — L. 5 mm.

Die ♀ der verschiedenen Unterarten und Varietäten können wie folgend unterschieden werden:

1. Kopf und Stielchen größtenteils glänzend . . . *ruzskyi*.
Kopfseiten in größerer Ausdehnung skulpturiert und glanzlos;
Stielchen größtenteils glanzlos. — 2.
2. Kopf deutlich länger als breit. — 3.
Kopf kaum länger als breit; die Seiten des Kopfes lassen
eine Streifung erkennen, die vor den Hinterecken um-
biegt. — 6.
3. Postpetiolus wenig breiter als lang . . . *huberi* i. sp.
Postpetiolus wenigstens $\frac{1}{3}$ breiter als lang. — 4.
4. Epinotumzähne klein; Petiolusknoten oben mit stark abge-
rundetem Winkel. — 5.
Epinotumzähne wohl ausgebildet; Petiolusknoten oben mit
ziemlich scharfem Winkel var. *christophi*.
5. Kopf mit deutlich gebogenen Seiten; Petiolusknoten bedeutend
schmäler als der Postpetiolus var. *gallica*.
Kopf mehr rechteckig mit geraden Seiten; Petiolusknoten
breiter var. *foreli*.
6. Größer; Stirn mit länglichen Punkten, wenig glänzend.
rehbinderi.
Kleiner; Stirn fast glatt, stark glänzend . . var. *ceconii*.

Str. huberi huberi For.

♀. Schmutzig rotgelb; Kopf bräunlich. Kopf verhältnismäßig schmal und mit gebogenen Seiten; Seitenteile des Kopfes matt, dicht punktiert, besonders hinter den Augen mit mehr oder weniger deutlichen Längsrünzeln, welche eine Tendenz zur Maschenbildung aufweisen, dazwischen grübchenartige, haartragende Punkte; an Scheitel sind solche Punkte zerstreut, hier und da mit Spuren von Längsstrichelung. Thorax dicht punktiert und gerunzelt,