

voir 6 dents, la troisième plus petite, ce qui s'accorde avec deux petites ♀ de Birmanie (Carin, voyage FEA) que j'ai dans ma collection. Or, comme BINGHAM cite FEA, à propos de cette espèce, je suis convaincu qu'il a eu en vue la même forme. Quoi qu'il en soit, je décris cette ♀, qui devient le type de mon espèce.

♀. Jaune, le dessus de la tête et du pronotum légèrement enfumé; pubescence de la tête et du corselet presque également longue et copieuse, ce qui fait que ces parties sont également luisantes; les poils dressés sont beaucoup plus courts que chez *Ps. Mayri*. Tête un peu plus longue que large, à part cela à peu près de la même forme que chez *Mayri*; mandibules à 6 dents, la troisième beaucoup plus petite que les autres; yeux comprenant environ 7 ou 8 facettes dans leur diamètre, placés aux  $\frac{2}{5}$  environ de la longueur de la tête; antennes un peu plus courtes que chez *Ps. Mayri*. Corselet beaucoup moins trapu que chez cette espèce; pro-mésonotum moins large et moins bombé; sur le profil, le corselet est beaucoup moins profondément impressionné derrière le mésonotum, les stigmates du métanotum ne font pas saillie dans l'impression; l'épino-tum est endommagé dans les deux exemplaires. Ecaille à faces parallèles, arrondie sur la tranche et impressionnée à son bord supérieur.

L. 3.3 mill.; tête  $0.9 \times 0.8$ ; scape 0.9; tibia post. 0.9 mill.

D'après BINGHAM, cette espèce se trouve à Sikkim et dans la Birmanie de 1,000 à 2,000 mètres.

### **Ps. Bedoti** n. sp.

♀. Jaune, un peu grisâtre, copieusement pubescente et poilue. La tête est large, les yeux moins distants du bord antérieur que leur diamètre, leur bord postérieur placé un peu en arrière de la moitié des côtés. Scapes dépassant d'environ  $\frac{1}{5}$  les angles postérieurs. Mandibules à 6 dents, la troisième beaucoup plus petite. Ecaille cunéiforme, vue de profil; tronquée et légèrement impressionnée au sommet. Gastre très volumineux. Ailes enfumées plus fort que chez *Ps. breviceps*.

L. 9 mill.; tête  $1.7 \times 1.8$ ; scape 1.6; tibia post. 1.8; aile 10 mill.

♂. Jaune-gris pâle, surtout les membres, la tête enfumée. Tête large, en trapèze court; yeux occupant environ la moitié des côtés; ocelles grands, déprimés. Mandibules en pointe, sans aucune dent. Antennes beaucoup plus courtes que chez les autres espèces; scape dépassant de peu plus de  $\frac{1}{3}$  de sa longueur le bord postérieur; premier article du funicule pas beaucoup plus épais et à peu près égal en longueur au second; les suivants un peu plus longs qu'épais.