

Corselet très large, plus large que la tête. Ailes beaucoup plus pâles que chez la ♀.

L. 5 mill.; tête 0.8×1.1 ; scape 0.8; tibia post. 1.5; aile 6 mill.

Indes Néerlandaises (Amboine?), voyage BEDOT et PICTET. La ♀ diffère de *Ps. Binghami* (d'après la description sommaire de BINGHAM) par les ailes enfumées. Le ♂ diffère de tous les autres par sa tête large, combinée avec sa taille avantageuse.

LISTE DES ESPÈCES DE *PSEUDOLASIUS*
ESPÈCES D'ASIE ET DE MALAÏSIE

1. — *Ps. familiaris* F. SM.
Formica familiaris F. SM., J. Pr. Linn. Soc. Zool., vol. 4, suppl., p. 68, 1860, ♀.
2. — *Mayri* n.
Lasius familiaris MAYR, Noværa Reise, Formic., p. 55, 1865, ♀.
Lasius familiaris MAYR, Tijdschr. Entom., vol. 10, p. 74, 1867, ♀♂.
Ps. familiaris EMERY, Ann. Mus. Civ. Genova, vol. 24, p. 245 nota, 1887, ♀♂ nec ♀.
Ps. familiaris EMERY, ibid., vol. 40, p. 700, 1901, ♀.
3. — *Binghami* n.
Ps. familiaris FOR., J. Bombay N. H. Soc., vol. 8, p. 405, 1894, ♀.
Ps. familiaris BINGHAM, Fauna Br. India; Hym., vol. 2, p. 338, fig. 101, 1903, ♀♀.
4. — *Bedoti* n. sp.
5. — *fallax* n.
Ps. familiaris EMERY, l. c. 1887, ♀ nec ♀♂.
6. — *breviceps* EMERY, Ann. Mus. Civ. Genova, vol. 24, p. 246, 1887, ♀♀♂.
Ps. familiaris FOR., Mitt. Zool. Mus. Berlin, vol. 2, p. 25, 1901, ♀♂.
7. — *pheidolinus* EMERY, l. c., p. 245, 1887, ♀♀.
8. — *minutus* EMERY, Ann. Soc. Ent. Belgique, vol. 40, p. 248, 1896, ♀♂.
9. — *tenuicornis* EMERY, Ann. Mus. Civ. Genova, vol. 38, p. 573, 1897, ♀.