

courtes, le scape dépasse un peu le bord occipital. Chez les petites ♂♂, la tête est uniformément luisante, elle est plus large derrière, trapézoïde, les yeux sont plus rapprochés du bord postérieur, les antennes sont relativement et même absolument plus longues, le scape dépasse le bord occipital d'une quantité qui peut aller jusqu'à  $\frac{2}{5}$  de leur longueur. Pro-mésotum à peu près aussi large que long en demi-cercle devant, marginé; impression méso-épinotale profonde; face basale de l'épinotum plus longue que large, bordée d'une arête saillante sur les côtés, terminée de chaque côté par une épine arquée et mousse; les deux épines et la limite de la face basale et de la face déclive, qui est entre deux, faisant, quand on regarde le corselet par dessus, comme un croissant, dont les épines représentent les cornes; bas de la face déclive lisse et luisant. Écaille très épaisse, avec une face dorsale bombée, déclive en avant, plus étroite devant que derrière et dont le bord antérieur (qui constitue proprement la tranche de l'écaille) est arqué et se prolonge de chaque côté par une épine courte, presque horizontale. Gastre lisse et très luisant.

L. de la grande ♂, 6.5 mill.; tête  $1.4 \times 1.4$ ; scape 1 mill.

L. de la petite ♂, 4.5 mill.; tête  $0.8 \times 1$ ; scape 1,1 mill.

♀. Jaune roux, la région des ocelles, une tache bifurquée sur le mésotum, le scutellum, l'épinotum et l'écaille noirs, le gastre brun fauve, avec une large bande plus foncée sur le bord des segments; pattes brunes, les hanches et une partie des cuisses plus claires. Structure et sculpture de la tête à peu près comme chez le ♂. Corselet lisse et luisant, sauf l'épinotum qui est sculpturé (ainsi que l'écaille) comme chez les neutres. Scutellum plat, au même niveau que le scutum; face basale de l'épinotum médiocrement convexe, avec un rudiment de dent de chaque côté; face déclive presque verticale, mais non séparée de la face basale par une arête. Écaille comme chez l'♂.

L. 8 mill.; tête  $1.6 \times 1.5$ ; scape 1.2 mill.

Mapiri (Bolivie), 14, 4 ♂, 2 ♀.

### **C. longipilis** n. sp.

♀. Tête et scapes noirs, mandibules brun-ferrugineux foncé, dessus du corselet brun, une bande nuageuse transversale de la même couleur sur chaque segment du gastre, le reste fauve, les tibias et tarses postérieurs plus ou moins rembrunis. Tout le corps est luisant, excepté la tête qui est finement réticulée et peu luisante, surtout dans sa partie antérieure. Pubescence du corps très courte et éparse; sur les pattes une pubescence demi-dressée,