

EMERY ou *bifoveolata* MAYR). La tête est presque une fois et demie aussi longue que large, arrondie derrière ; ce qui frappe d'abord, ce sont les énormes yeux ; ils ne font presque pas saillie, lorsqu'on regarde la tête par-dessus, mais ils occupent environ $\frac{2}{5}$ de sa longueur et les deux yeux ne sont distants entre eux que du $\frac{1}{3}$ de la largeur de la tête ; pas d'ocelles ; arêtes frontales très rapprochées ; épistome abruptement incliné, très légèrement avancé au milieu de son bord antérieur, sans dents ; mandibules presque droites à leur bord externe, armées de quatre dents assez petites ; antennes plus minces que chez *S. emeryi*. Corselet grêle, pronotum déprimé et obtusément marginé, la suture pro-mésonotale légèrement déprimée, la suture méso-épinotale en angle obtus ; épinotum arrondi, sur le profil. Pétiole très allongé et mince, très légèrement renflé sur les côtés ; postpétiole en forme de poire, plus long que large, sa plus grande largeur au quart postérieur. — L. 3.5 mill.

Kamerun (CONRADT) un exemplaire (type) ; un exemplaire du Congo, Stanleyville (P. H. KOHL), qui m'a été envoyé par le P. WASMANN, est plus foncé, notamment la tête, mais je n'ai remarqué aucune autre différence.

Diffère de *S. emeryi* surtout par la grandeur des yeux, l'épistome mutique, la forme plus grêle du pédicule et le tégument moins luisant.

III. — *Stegomyrmex* n. gen.

♀. — Tête ressemblant en gros à celle de *Cyphomyrmex rimosus* : le dessus de la tête, avec les arêtes frontales formant un plateau bifurqué par devant, qui domine les scrobes et l'épistome et ne laisse voir des parties placées au dessous de lui que les yeux, l'aire frontale incunée entre les arêtes frontales et les mandibules grandes, falciformes, pourvues de très petites dents. Ce plateau est parcouru par deux sillons qui partent ensemble de la bifurcation des arêtes frontales et se dirigent obliquement vers le bord occipital, qu'ils atteignent presque. Les scrobes sont profondes et larges, elles atteignent presque le bord postérieur de la tête et logent le scape. Les antennes sont de 12 articles ; le scape est épais, aminci et courbé à la base, mais point plat et point lobé (comme chez *Ceratobasis*) ; le dernier article est à peu près long comme le tiers du funicule. Epinotum armé d'une paire de courtes épines. Pétiole pédonculé, à nœud arrondi, armé en dessous de deux épines ; postpétiole court, arrondi ; segment basal dorsal du gastre scutiforme, recouvrant les autres. Aile antérieure avec ptérostigma bien développé, cellule radiale fermée, deux cubitales fermées et discoïdale ; la nervure transverse qui ferme la 2^{me} cubitale est