

nella *punctaticeps*; i denti laterali del clipeo sono poco distinti, gli occhi, relativamente grandi, sono composti soltanto di 3 o 4 faccette mal distinte; i lati del capo sono arcuati più che nelle singole forme della *S. punctaticeps*, più che negli esemplari di pari grandezza della subsp. *erythraea*. Devo notare che la figura del capo pubblicata dal Santschi mi sembra inesatta, per cui ne disegno un'altra più corretta.

Quali potrebbero essere i caratteri delle ♀ di maggiori dimensioni, se ne esistono, è impossibile indovinare. Tutto compreso, la specificità di questa forma mi sembra abbastanza dimostrata.




Fig 7. - *S. punctaticeps* var. *cleptomana* Sant.: capo di un tipo: coll. Santschi.

In quanto alla *S. cleptomana* Sant., dopo aver accuratamente esaminato il tipo favoritomi dall'autore, ritengo che sia una semplice varietà della *punctaticeps*, la quale differisce dalla forma tipica quasi soltanto pel colore scuro, anche nelle piccole ♀.

La sinonimia delle forme del gruppo *punctaticeps* sarebbe dunque:

- S. punctaticeps punctaticeps* Mayr (1865)
- var. *cleptomana* Sant. (1914)
- punctaticeps caffra* For. (1894)
- diversipilosa* Mayr (1901)
- cyclops* Sant. (1914), var. ?
- punctaticeps indocilis* Sant. (1914)
- punctaticeps erythraea* n.
- S. maligna* Sant. (1909)