

Nella fauna d'Europa, sono registrate le seguenti formiche, che ritengo verosimilmente ibride (1):

- Myrmica ruginodo-levinodis*, For.,  
 — *sulcinodo-scabrinodis*, For.,  
 — *sulcinodo-ruginodis* (For.), Donisth.,  
 — *scabrinodo-lobicornis*, For.
- Formicina nigro-emarginata*, For.,  
 — *alieno-nigra*, For.,  
 — *alieno-brunnea*, For.,  
 — *nixto-umbrata*, For.,  
 — *hybrida*, Emery (*umbrata* Nyl. + *distin-  
 guenda* Emery?).
- Formica rufo-pratensis*, For.,  
 — *piniphila*, Schenck (*rufa*, L. + *pratensis*,  
 Retz.),  
 — *truncicolo-pratensis*, For.,  
 — *exsecto-pressilabris*, For. (*exsecta* Nyl. +  
*pressilabris*, var. *Foreli*, Emery).  
 — *fusco-gagates*, For.,  
 — *fusco-rufibarbis*, For.,  
 — *cinereo-rufibarbis*, For.
- Camponotus herculeano-ligniperda*, For.,  
 — *dalmatinus*, Nyl. (*lateralis*, Ol. + *me-  
 rula*, Los.).
- Leptothorax tubero-affinis*, For.,  
 — *tubero-nigriceps*, For.,  
 — *tubero-interruptus*, For.,  
 — *unifasciato-interruptus*, For.,  
 — *unifasciato-nigricipoides*, For.,
- Crematogaster hybrida*, Emery (*scutellaris*, Ol. +  
*schmidti*, Mayr).

---

(1) Conf.: Viehmeyer. Abh. Naturwiss. Ges. Isis (Dresden),  
 1915, p. 61.