

2) Bacino del Mediterraneo con le Canarie e l'Asia centrale.

3) Regione orientale ed australiana del WALLACE.

S'intende che singole specie trasgrediscono i limiti delle rispettive zone, come per es. la sottospecie *C. maculatus aegyptiacus*, che giunge dalla Regione etiopica per l'Egitto al Mediterraneo, ed il *C. compressus* che si spinge, dalla zona mediterranea, dove vive il maggior numero delle sue forme, attraverso l'Indostan fino a Ceilan.

Ecco ora l'elenco delle specie, sottospecie e varietà nelle quali, secondo i miei studi, si suddivide la superspecie *C. (Myrmoturba) maculatus* F. nell'emisfero orientale.

Sp. 1. *maculatus* F.

Gruppo tipico : tibie armate di aculei al margine flessorio.

subsp. *maculata* F.

var. *cluisoides* For.

— *conakryensis* n.

— *erythraea* n.

var. *lohieri* Sant.

— *melanocnemis* Sant.

— *schultzei* For.

— *semispicata* Sant.

— *aegyptiaca* Emery.

— *ballioni* For.

var. *boera* For.

— *intonsa* Emery.

(*cognatus* For. nec F. Sm.).

— *desantii* Sant.

— *importuna* For.

— *liengmei* For.

var. *hansingi* For.

— *importunoides* For.

— *lividior* Sant.

— *manzer* For.

var. *contaminata* Sant.

— *mathildae* For.

— *sarmentus* n.

— *schereri* For.

Gruppo *radamooides*: tibie senza aculei al -margine flessorio eccetto uno o due all'estremità.

subsp. *atramentaria* For.

var. *cluis* For.

— *cavallus* Sant.

— *hannae* Sant.

— *hieroglyphica* Sant.

— *miserabilis* Sant.

— *pulvinata* Mayr.

— *radamooides* For.

var. *cataractae* Sant.

— *diffusa* Sant.

— *liocnemis* Emery.

— *madecassa* Emery.

Incertae sedis :

subsp. *cognata* F. Sm.

— *lacteipennis* F. Sm.

— *legionarium* Sant.

Sp. 2. *hova* For.

subsp. *hova* For.

var. *hova-hovoides* For.

— *hovoides* For.

— *luteola* For.

— *mixtella* For.

— *obcurior* For.